



*Hannia Valeria Santis Lopez*

*Cuadro sinóptico*

*Parcial 2*

*Patologías y técnicas quirúrgicas de aves y conejos*

*Gonzalo Rodríguez Rodríguez*

*Medicina Veterinaria y Zootecnia*

*Cuatrimestre 5*

**AFECCIONES DIGESTIVAS EN AVES**

**Coccidiosis**

Es

Una enfermedad parasitaria que afecta el tracto intestinal.

Agente causal

Causada por protozoos del Phylum Apicomplexa, familia Eimeriidae.

Signos

Diarrea severa con presencia de moco o sangre. Deshidratación. Anemia. Plumas erizadas. Disminución de peso, pudiendo producirse una alta mortalidad.

Tratamiento

Se usan anticoccidiales. Estos productos van a actuar en la primera fase del ciclo de vida del coccidio evitando la aparición de sintomatología

**Malabsorción aviar**

Es

Una enfermedad compleja y multifactorial, típica de aves jóvenes

Agente causal

Ocasionada por diferentes agentes infecciosos (virus, bacterias, protozoarios). El **reovirus** es el microorganismo que se reporta con mayor frecuencia

Signos

Postración, cojeras, diarreas, baja ganancia de peso vivo, emplume deficiente y retraso del crecimiento.

Tratamiento

Se recurre a un tratamiento sintomático por medio de la adición en el agua de bebida de niveles de vitaminas y aminoácidos en la dieta

**Enteritis necrótica**

Es

Una infección aguda que se caracteriza por necrosis severa de la mucosa intestinal.

Agente causal

Es producida por Clostridium perfringens tipo A y C

Signos

Aumento repentino de la mortalidad. También pueden observarse depresión, plumas erizadas y diarrea.

Tratamiento

Se usan antimicrobianos, se suelen administrar en el agua de bebida. Los antimicrobianos más utilizados son la bacitracina, penicilina y lincomicina

**Criptosporidiosis**

Es

Una enfermedad parasitaria

Agente causal

Es producida por protozoos (filo Apicomplexa) que pertenecen a la familia Criptosporidiidae

Signos

El síntoma principal es diarrea acuosa, a menudo con otros signos de malestares gastrointestinales y la deshidratación. Además de la diarrea, los parásitos pueden infectar el tracto respiratorio y provocar tos, jadeo, aerosaculitis y, en ocasiones, la muerte.

Tratamiento

Consiste en reponer electrolitos, administrar líquidos orales o parenterales y dar soporte nutricional. También se pueden administrar remedios antidiarreicos

**Histomoniasis**

También llamada enfermedad de la cabeza negra es una entidad compleja, afecta principalmente a los pavos con lesiones en el ciego y en el hígado

Agente causal

Es causada por el protozoo flagelado, Histomonas meleagridis

Signos

La sintomatología principal es la presencia de cianosis de la carne en la cabeza, también síntomas como somnolencia excesiva, ojos cerrados de manera anormal, cabeza baja, caminar en tensión, las en posición colgante, etc.

Tratamiento

No tienen un tratamiento específico, la prevención es la única forma de tratar esta enfermedad

**Vómito negro**

Es

Una enfermedad que se caracteriza por lesiones en la molleja y menos en el proventrículo y buche

Agente causal

Causada por el uso de harina de pescado de baja calidad

Signos

Aparecen a los 5-10 días después de administrarle el nuevo alimento, e incluyen anorexia, síndrome anémico depresivo, deshidratación, diarrea, palidez, plumas erizadas, distensión del buche, líquido oscuro por las fosas nasales y pico hasta la muerte.

Tratamiento

Se debe prevenir esta patología utilizando concentraciones de harina de pescado debajo del 10% si se le va a administrar esa clase de harina