

Nombre del Alumno: Nevi Sherly García Rodríguez
 Nombre del tema: PARASITOS Y PRINCIPALES INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN PORCINOS
 Parcial: 4
 Nombre de la Materia: INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS EN PORCINOS
 Nombre del profesor: M.V.Z Gonzalo Rodríguez Rodríguez
 Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 Cuatrimestre: 5 B

Lugar y fecha de elaboración: La Independencia, Chiapas
 29 de Marzo del 2025

PARASITOS E INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN PORCINOS

<p>Enfermedad causada por larvas de <i>Toenia solium</i>. Localizados principalmente en la lengua, músculos masticadores, corazón, músculos diafragmáticos y cerebro.</p>	<p>CISTECERCOSIS PORCINA</p> <p>Ciclo de vida de <i>Toenia solium</i></p>	<p>Los cerdos adquieren el agente causal de <i>Toenia solium</i> al ingerir carne contaminada. Las larvas se alojan en el músculo del cerdo. El ser humano adquiere la enfermedad al ingerir carne contaminada que contiene las larvas.</p>
<p>Parásito interno causado por <i>Steghanurus dentatus</i>, presente en los riñones, de la grasa alrededor de ellos, uréteres o en los tejidos cercanos.</p>	<p>ESTRONGILOSI RENAL</p>	<p>El género <i>Steghanurus</i> es el único género humano que con frecuencia causa problemas. Las larvas se alojan en el riñón y las larvas se alojan en el riñón. El ser humano adquiere la enfermedad al ingerir carne contaminada que contiene las larvas.</p>
<p>Parasitosis causada por varias especies de <i>Metastrongylus</i> siendo el más común <i>M. apri</i> el cual se aloja en la tráquea y en los bronquios pulmonares causando distintos grados de irritación e inflamación.</p>	<p>METASTRONGILOSI</p>	<p>Los cerdos se infectan al consumir heces de cerdos que contienen huevos de <i>Metastrongylus</i>. El ser humano adquiere la enfermedad al ingerir carne contaminada que contiene las larvas.</p>
<p>Infección causada por la presencia de <i>ascaris suum</i>. Un parásito que afecta al intestino delgado de los cerdos jóvenes. Caracterizada por problemas digestivos, respiratorios y nerviosos así como retraso en el crecimiento.</p>	<p>ASCARIASIS</p>	<p>Los cerdos se infectan al ingerir heces con larvas infectadas, las cuales migran a los pulmones, ascienden a la tráquea, son deglutidas y migran al intestino delgado, donde se convierten en gusanos adultos que ponen huevos, que son excretados con las heces, reiniciando el ciclo.</p>
<p>Causada por el género <i>Trichostrongylus</i>. Parásitos que afectan al intestino delgado, provocando problemas digestivos, pérdida de peso, diarrea y retraso en el crecimiento.</p>	<p>TRICHOSTRONGILOSI</p>	<p>Los cerdos adquieren los huevos de las larvas en las heces. Las larvas se alojan y se desarrollan en el ambiente, pasando por las etapas de huevo, larva y pupa. El ser humano adquiere la enfermedad al ingerir carne contaminada que contiene las larvas.</p>