



**Nombre de alumno: Sebastián Urbina
Sánchez**

**Nombre del profesor: Lorena Guadalupe Solís
Meza**

Nombre del trabajo: Super nota.

Materia: Bovinos.

Grado: 5.

Grupo: B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 4 de Marzo de 2025.

PROLAPSO VAGINAL Y DE UTERO

El prolapso vaginal se trata de la salida invertida de la vagina, por lo general ocurre en vacas maduras durante la gestación y el uterino ocurre cuando se sale la matriz durante u horas después del parto.

FACTORES PREDISPONENTES

- Factores genéticos.
- Relajación excesiva de los ligamentos pélvicos y tejidos vaginales antes del parto.
- Obesidad o exceso de grasa pélvica.
- Dietas ricas en estrógenos .
- Condiciones que aumentan la presión intraabdominal (embarazo avanzado, ascitis, meteorismo).



TX

- Limpiar con solución salina y antisépticos.
- Aplicar azúcar o soluciones hiperosmóticas para reducir el edema.
- Usar anestesia epidural y reposicionar manualmente.
- Asegurar que los cuernos uterinos estén bien reintroducidos.




SIGNOS CLINICOS.

- Inflamación y posible necrosis si no se trata a tiempo.
- Gran masa roja y húmeda saliendo de la vulva.
- Sangrado y edema en el tejido prolapsado.
- Shock hipovolémico.



PREVENCION.

- Evitar dietas ricas en estrógenos.
- Control del peso en vacas preñadas.
- Asistencia cuidadosa en el parto para evitar esfuerzos excesivos.
- Suplementación con calcio en vacas con riesgo de hipocalcemia.
- Selección genética: No reproducir vacas con historial de prolapsos.



Bibliografía

UDS. (2023). Antología.