



UGUADS

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Erika Alexandra Pérez Méndez.

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas de Bovinos.

Nombre del Maestro: Lorena Guadalupe Solís Meza.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 5

SUPER NOTA

PROLAPSO VAGINAL Y UTERINO



Son anomalías reproductivas que ocurren cuando el útero o la vagina se desliza hacia el exterior.

Prolapso Uterino:

Ocurre cuando el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella.

. Se produce a las pocas horas después del parto, pero puede retrasarse algunos días.

Prolapso Vaginal:

Se produce cuando la vagina se prolapsa, con el cuello uterino visible en la parte más caudal del tejido prolapsado.

. Se puede clasificar en tres grados:

. **Grado I:** prolapso intermitente. . **Grado II:** prolapso agudo.

. **Grado III:** prolapso agudo continuo de vagina, vejiga y cérvix.

Factores Predisponentes:

- . Edad: mas frecuentes en hembras adultas.
- . Genética.
- . Hormonas.
- . Parto: extracción rápida del feto.
- . Alimentación.
- . Establecimiento.
- . Transporte.
- . Retención de placenta.
- . Tamaño de la cría.

Síntomas:

Prolapso Uterino

- . Hemorragia y posible retención de placenta.
- . Pesadez en la pelvis o la vagina.
- . Debilidad.
- . Shock.
- . Muerte.

Prolapso Vaginal

- . Inflamación.
- . Pliegues cervicales flácidos, agrandados, hiperémicos.
- . Distensión y un prolapso.

Tratamiento:

- . Limpiar y desinfectar la superficie endometrial.
- . Administrar un anestésico.
- . Administrar antibióticos.
- . Administrar antiinflamatorios.
- . Administración de calcio.

Bibliografía:

Contexto Ganadero . (16 de 1 de 22). Obtenido de Contexto Ganadero : <https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/que-hacer-cuando-ocurre-un-prolapso-de-la-vagina-en-las-vacas>

Celiz, C. (14 de 4 de 23). Content. Obtenido de Content: <https://ridaa.unicen.edu.ar:8443/server/api/core/bitstreams/db8coe37-318b-494d-95c5-d963bda6b558/content>

