

Docente: Lorena Guadalupe
Solis Meza.

Alumno: Crhistian Alexis
Santiago Gonzales.

Asigantura: Patologia y
tecnicas quirurgicas en bovinos.

Grado y Grupo: 5^aB

DIFERENCIAS ENTRE NEMATODOS, CESTODOS Y TREMATODOS

NEMATODOS

- Tienen forma cilíndrica.
- Habitan en el TGI.
- Transmisión: Orofecal y por fomites.



SIGNOS Y SINTOMAS

- Inapetencia.
- Mucosas pálidas
- Síndrome de mala absorción.
- Anemia.
- Edemas
- Diarreas
- Disminución de la producción
- Muerte
- Distensión abdominal
- Deshidratación.

TRATAMIENTO

- Ivermectina.
- Albendazol.
- Mebendazol.
- Fumarato de pirantel



TREMATODOS

- Forma alargada, ovalada y aplanada.
- Transmisión: Agua contaminada, ingesta de moluscos, consumo de peces.
- Se alojan en hígado, pulmones, intestinos y vasos sanguíneos.



Tratamiento

- Albendazol
- Fumarato de pirantel
- Praziquantel
- Mebendazol
- Ivermectina.

SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor abdominal
- Eructo
- Hepatomegalia
- Cistitis
- Diarrea
- Prurito
- Debilidad muscular.
- Convulsiones
- Disnea
- Ictericia

CESTODOS

- Planos y alargados.
- Afectan al intestino del animal.
- Transmisión: Oro-fecal y por fomites.



TRATAMIENTO

- Pérdida de peso
- Diarrea
- Gases
- Expulsión de segmentos

SIGNOS Y SINTOMAS

- Praziquantel
- Niclosamida
- Albendazol
- Mebendazol

Bibliografias:

(S/f-b). Com.mx. Recuperado el 24 de enero de 2025, de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/3f8ce5d2d8b2c81f1a85566ef0f61d63-LC-LMV503-PATOLOGIA%20Y%20TECNICAS%20QUIRURGICAS%20DE%20BOVINOS.pdf>