Nombre de alumno: Azul Ximena Urbina Sánchez

Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de aves

Grado: 5

Grupo: B

PARCIAL 2

COCCIDIOSIS

definicion

La **coccidiosis aviar** es una enfermedad parasitaria causada por protozoarios del género *Eimeria*, que afecta el tracto intestinal de las aves, especialmente pollos y pavos. Se transmite por la ingestión de ooquistes en alimentos, agua o a través del contacto con heces contaminadas.

Síntomas

- Pérdida de apetito
- Plumaje erizado
- Letargo o debilidad
- Disminución del crecimiento en pollos jóvenes
- Diarrea (puede ser sanguinolenta o con moco)
- Enteritis (inflamación intestinal)
- Deshidratación

Tx

- Anticoccidianos: Se usan fármacos como *amprolio*, *sulfacloropiridazina*, *toltrazuril* o *sulfaquinoxalina*, administrados en el agua o alimento.
- **Vitaminas y electrolitos**: Ayudan a la recuperación del ave.

SINDROME DE MALA ABSORCION

Definición

El **síndrome de mala absorción aviar** (SMA) es un trastorno digestivo que afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes esenciales en pollos de engorde y otras aves comerciales. Puede estar relacionado con infecciones virales (*Reovirus* es un agente común), deficiencias nutricionales, alteraciones enzimáticas o daños en la mucosa intestinal.

Signos

- Aves con bajo peso
- Plumas malformadas o erizadas ("síndrome del pollo pelón")
- Picos y patas pálidas debido a desnutrición
- Diarrea crónica
- Heces con grasa no digerida (esteatorrea)
- Distensión abdominal

Tx

- **A** Manejo nutricional
- Control sanitario
- Tratamiento de soporte

ENTERITIS NECROTICA

Definición

La **enteritis necrótica** es una enfermedad intestinal grave causada por la proliferación excesiva de la bacteria *Clostridium perfringens* en el intestino delgado de las aves, principalmente pollos de engorde y pavos

Signos

- Letargo y debilidad
- Plumaje erizado
- Disminución del apetito
- Diarrea fétida de color marrón oscuro o sanguinolenta
- Mortalidad súbita y elevada (puede superar el 50%)

Tx

Tratamiento con Antibióticos (bajo prescripción veterinaria)

- *Amoxicilina*, *penicilina*, *bacitracina* o *tilosina* en el agua de bebida o alimento
- *Ácidos orgánicos* (ácido butírico, propiónico) para reducir la proliferación de *Clostridium*

CRIPTOSPORIDIOSIS

Definición

La **criptosporidiosis aviar** es una enfermedad parasitaria causada por *Cryptosporidium spp.*, un protozoario que infecta principalmente el **tracto gastrointestinal y respiratorio** de las aves. Afecta a pollos, pavos y otras especies, provocando diarrea, retraso en el crecimiento y, en casos graves, mortalidad.

Signos

- Diarrea acuosa persistente
- Deshidratación y pérdida de peso
- Plumas sucias alrededor de la cloaca
- Disminución en la conversión alimenticia

Tx

Tratamiento de soporte

- **Electrolitos y vitaminas** para reducir la deshidratación
- **Probióticos y prebióticos** para fortalecer la flora intestinal
- **Mejor manejo ambiental** para reducir el estrés en las aves

HISTOMONIASIS

Definición

La **histomoniasis aviar** (o **enteritis infecciosa del pavo**) es una enfermedad causada por el protozoario *Histomonas meleagridis*. Afecta principalmente a **pavos, gallinas y otras aves de corral**, provocando lesiones en el hígado y el ciego.

Signos

- Letargo y debilidad
- Pérdida de peso y apetito
- Plumaje erizado y opaco
- Cabeza cianótica (azulada) en pavos
- Diarrea amarillenta espumosa (color mostaza o azufre)
- Inflamación del ciego (con formación de necrosis)
- Hepatitis necrótica con lesiones redondeadas en el hígado

Tx

No existen medicamentos específicos aprobados para tratar la histomoniasis en aves de corral, por lo que el enfoque principal es **el manejo y la prevención**.

VOMITO NEGRO

Definición

El **"vómito negro" aviar** es una afección grave caracterizada por el regurgitamiento de un líquido oscuro o sanguinolento. No es una enfermedad específica, sino un **síntoma** asociado a varias enfermedades

Signos

- Pérdida de apetito.
- Letargo y debilidad.
- Plumaje erizado.
- Deshidratación
- Regurgitación de líquido oscuro o sanguinolenta
- Diarrea, a veces con sangre
- Inflamación del buche o proventrículo.
- Pérdida de peso

Tx

Tatamiento de soporte
Tratamiento especifico
Prevención