



NOMBRE DEL ALUMNO: NERI RAMÍREZ ÁLVAREZ

NOMBRE DEL TEMA: PATOLOGIAS DE CONEJOS

PARCIAL: 4

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE CONEJOS

NOMBRE DEL PROFESOR: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GONZALO

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 5

PATOLOGIAS DE CONEJOS

MIXOMATOSIS EN CONEJOS

La mixomatosis es una enfermedad viral grave y mortal que afecta a los conejos. Es causada por el virus mixoma, un poxvirus.

Síntomas

- Bultos o nódulos cutáneos, llamados mixomas, que aparecen principalmente en la cabeza, las orejas y en la zona de los genitales y el ano
- Fiebre
- Blefaritis y blefaroconjuntivitis
- Inflamación alrededor de los párpados
- Inflamación de las orejas
- Hemorragia cutánea
- Convulsiones

Transmisión

- Por contacto directo entre animales
- Por contacto con objetos inanimados contaminados
- Por picaduras de insectos que se alimentan de sangre, pulgas y mosquitos

Medidas de control

- Vacunación
- Protección contra los mosquitos
- Aislamiento de los animales infectados
- Desinfección adecuada de jaulas y del material que haya entrado en contacto con un animal infectado
- No alojar conejos salvajes con conejos domésticos

Tratamiento

No hay un tratamiento específico.



PASTEURELOSIS EN CONEJOS

Es una enfermedad bacteriana que afecta a los conejos y es causada por la bacteria Pasteurella multocida

Síntomas

- Rinitis, otitis, coriza, neumonía
- Estornudos persistentes
- Obstrucción nasal
- Secreción mucopurulenta
- Fiebre
- Meteorismo
- Diarrea fétida seguida de estreñimiento
- Dolores abdominales

Transmisión

- Contacto directo con conejos infectados, Fómites contaminados, Aerosolización, De las hembras a las crías durante el parto y la lactancia, Inhalación de partículas contaminadas en el aire. as y mosquitos

Prevención y tratamiento

- Lavarse las manos entre cada manipulación y lavarse siempre las manos y la ropa después de manipular un conejo que no sea suyo
- Buscar atención veterinaria inmediata ante los primeros signos
- Utilizar autovacunas específicas
- Utilizar antibióticos como la oxitetraciclina y la tilmicosina



CATARROS Y NEUMONÍAS EN CONEJOS

El resfriado y la neumonía son enfermedades respiratorias que afectan a los conejos.

Síntomas De Resfriado

- Estornudos frecuentes y repetidos
- Secreción nasal líquida o purulenta
- Inflamación ocular
- Inflamación de los pulmones o los oídos
- Dolor y disnea
- Fiebre
- Debilidad
- Pérdida de apetito

Síntomas De Neumonía


- Anorexia
- Pérdida de peso
- Letargo
- Fiebre
- Dificultad para respirar
- Membranas mucosas cianóticas
- Hemoptesis (tos con sangre)
- Hipotermia por shock

Transmisión

Por contacto directo, por el aire o por inhalación de objetos extraños.

Prevención y tratamiento

- Antibióticos
- Doxiciclina y Enrofloxacina vía oral
- Oxitetraciclina y Tilmicosina en los registrados para la administración vía pienso
- Amikacina, azitromicina, cefotaxima, clortetraciclina, gentamicina, marbofloxacino, moxifloxacino, rifampicina



ABSCESOS EN CONEJOS

Son bolsas de pus que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo

Síntomas

- Hinchazón, enrojecimiento y dolor en la zona afectada
- Secreción espesa y maloliente
- Pérdida de apetito
- Cambios de comportamiento, como esconderse
- Fiebre

Transmisión

Se transmiten por contacto directo con las bacterias que los causan. También pueden transmitirse por vía aérea.

Prevención y tratamiento

Cirugía para extirpar el tejido infectado, Antibióticos inyectados o orales, Analgésicos, Microesferas antibióticas o material de relleno impregnado.

METRITIS Y ORQUITIS EN CONEJOS

La metritis es una infección del útero, y la orquitis es una infección de los testículos. Ambas pueden ser causadas por P. multocida en conejeras donde la ventilación y la higiene sean deficientes, y donde exista una alta incidencia de catarros

Síntomas De Metritis

- Fiebre
- Útero agrandado, de color marrón rojizo, acuoso y maloliente
- Secreción acuosa o purulenta
- Apatía
- Inapetencia
- Frecuencia cardíaca elevada
- Baja producción en los primeros 7 días después del parto

Síntomas De Orquitis

- Hinchazón de uno o ambos testículos
- Dolor testicular
- Infecciones frecuentes, especialmente del epidídimo

Bacterias causantes

E. coli, Pseudomonas, Listeria, Proteus, Staphylococcus aureus.

Prevención y tratamiento

- Se pueden usar antibióticos como amikacina, azitromicina, cefotaxima, clortetraciclina, doxiciclina, gentamicina, marbofloxacino, moxifloxacino, o rifampicina.

Bacterias causantes

Pasteurella multocida

Prevención y tratamiento

Consiste en una castración quirúrgica y antibióticos.

