Nombre de alumno: Hannia Jolette Velázquez Pérez.

Nombre del profesor: :GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ..

Nombre del trabajo:Mapa conceptual

Materia:Aves y conejos.

Grado: Quinto cuatrimestre.

Grupo: B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de enero de 2025.

Aves.

Newcastle.

Su

SINONIMIA.

Es.

Neumoencefalitis aviar.
Pseudopeste aviar.
Peste aviar atípica.

El.

Contagio se da por Pajaros, ratas,exudados, alimentos contaminados.

Sus.

Sintomas son.
Falta de apetito.
Sed.
Temblores musculares.
v
Desviación lateral de la cabeza, a veces la misma mira hacia arriba, otras hacia abajo.

Dificultad respiratoria, virales, diarrea

La.

Prevencion y control se puede hacer con aislamiento o cuarentena estrictos de los brotes.

Control de plagas en las parvadas

El.

Tratamiento se logra mediante la vacunación, que se repite varias veces durante la vida del animal.
Primera vacunación a los 4 días e nacido con la cepa B1
Segunda a las 4 a 12 semanas con cepa La sota
Cada tres meses con la cepa La Sota

Influenza aviar.

La.

influenza aviar es una enfermedad viral que puede afectar a especies de aves a nivel mundial.

La.

causa virus con proteínas superficiales H5 o H7.

La.

Transmisión es a través de las heces de las aves infectadas o las secreciones de la nariz, la boca o los ojos de las aves y los seres humanos infectados.

Los.

Tos, Estornudos, Secreción nasal, Secreción ocular.
Plumaje erizado.
Disminución en la producción de huevos.

Su.

Profilaxis, prevención contaminación.
Separación de aves contaminadas y sus secreciones y excreciones.
Bioseguridad como primer línea de defensa
Evitar fómites.

Salmonelosis.

Es.

Una enfermedad infecciosa producida por la Salmonella, que es una bacteria en forma de bastón, muestra los primeros síntomas después de 2 a 3 días de fiebre y diarrea.

Los

Sintomas son:
Mal estado general del ave y la diarrea
Focos necróticos.
Diarrea.
Anorexia.
Somnolencia
Plumas erizadas y crestas pálidas

Su.

Transmisión se da por:
Por plagas y bacterias
Por la vía fecal – oral.

Su.

Tratamiento se realiza con medicamentos como Cekabiocin, el cual es una formula antimicrobiana compuesto principalmente de amoxicilina, Gentamicina y Metamizol.

Su.

Prevención
Higiene de los corrales o aviarios. Las instalaciones se deben mantener bien ventiladas y protegidas frente a plagas y aves silvestres.
Reducir los niveles de estrés. Manteniendo un nivel de densidad animal adecuada al espacio y a las necesidades comportamentales de cada especie.
Control de agua y alimentación.

Gumboro (virus EIBF).

Su.

SINONIMIA.
Enfermedad Infecciosa Bursal.
Enfermedad Virósica de la Bolsa de Fabricio.

Es.

Una enfermedad viral, infectocontagiosa de los pollos jóvenes, que puede afectar al pollo de engorde provocando inmunosupresión y mortalidad.

Los.

Síntomas.
Falta de apetito, plumas erizadas, decaimiento.
Somnolencia
Diarrea amarillenta o verde amarillenta
Es de rápida difusión y mortandad variable.
Puede variar de 7 a 10 días y mortandades entre el 1 al 20%

Su.

Tratamiento y profilaxis.
No existe tratamiento.
La vacunación se realiza con virus vivo atenuado.
La aplicación se puede realizar desde el primer día de edad en el agua o por gota en el ojo.
En aves de mayor edad se puede aplicar por vía intramuscular

Marek Parálisis de Marek (*Polineuritis).*

Se.

Caracteriza por tumores linfoidales, parálisis de las patas o de las alas y por una difusión rápida de la parvada.
Es una enfermedad viral neoplásica sumamente contagiosa en las gallinas.

Es.

Causada por un virus herpes alfa denominado virus de la enfermedad de Marek (MDV) o Gallid Herpesvirus 2 (GaHV-2)

Los.

Sintomas son:
Parálisis de patas y alas
Cojera
Las aves caen hacia atrás teniendo dificultad para pararse
Torsiones de cuello
Color gris de ojos y deformación de la pupila.
Falta de peso, palidez
Pata roja (produce hinchazón, edemas, enrojecimiento, se forman líneas rojas a lo largo de las patas.

El.

Tratamiento.
Se recomienda incluir la vacunación contra la enfermedad de Marek en el plan de vacunación de la granja

Onfalitis o infección del saco vitelino.

Es.

Una infección del ombligo del saco vitelino o de ambos.

Sus.

Causa directa de la infección es de tipo bacteriano (Escherichia Coli, Bacillus careaus, estafilococos, enterococos, Klebselia, Pseudomonias, Clostridium, Proteus.

El.

Tratamiento no hay en especifico. Solo hay prevención de medidas sanitarias.