



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Johan Rodriguez Morales

Nombre del tema: Cuadros de vacunación del estado de chiapas.

Parcial: 1°

Nombre de la Materia: Producción sustentable de carne

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 8°

CUADROS DE VACUNACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS



Bovinos



<p>Rabia:</p> <p>Primera dosis:</p> <p>Revacunación:</p>	<p>A los 3 meses de edad.</p> <p>Anual.</p>
<p>Leptospirosis:</p> <p>Primera dosis:</p> <p>Segunda dosis:</p> <p>Revacunación:</p>	<p>A los 4-6 meses de edad</p> <p>4 semanas después de la primera</p> <p>Anual.</p>
<p>Clostridiosis (Enfermedades Clostridiales):</p> <p>Primera dosis:</p> <p>Segunda dosis:</p> <p>Revacunación:</p>	<p>A los 3 meses de edad.</p> <p>4 semanas después de la primera.</p> <p>Anual.</p>
<p>Carbunco Bacteridiano (Ántrax)</p> <p>Primera dosis:</p> <p>Revacunación:</p>	<p>A partir de los 3 meses de edad.</p> <p>Anual.</p>





Porcinos



Mal Rojo (Erisipela): Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A las 8 semanas de edad. A las 4 semanas después de la primera. Cada 6 meses.
Parvovirus Porcino (en hembras reproductoras): Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A las 5 semanas antes del servicio A las 2 semanas antes del servicio Antes de cada servicio.
Peste Porcina Clásica: Primera dosis: Revacunación:	 A las 8 – 10 semanas de edad. Anual.





Equinos



Influenza Equina: Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A los 6 meses de edad. A las 4 semanas después de la primera. A cada 6 meses.
Encefalomielitis Equina: Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A los 3 meses de edad. A las 4 semanas después de la primera. Anual
Tétanos: Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A los 3 meses de edad. A las 4 – 6 semanas después después de la primera. Anual.





Ovinos



Carbunco Sintomático: Primera dosis: Revacunación:	 A los 3 meses de edad Anual
Enterotoxemia (Clostridiosis): Primera dosis: Segunda dosis: Revacunación:	 A las 6 – 8 semanas de edad. A las 4 semanas después de la primera. Anual.
Ectima Contagioso (Orf): Primera dosis: Revacunación:	 A las 6 semanas de edad. Anual.



