



Nombre de alumno:
Carlos Fabritzio Garcia Arias

Nombre del profesor:
MVZ. Jose Mauricio Padilla Gomez

Nombre del trabajo:
Supernota

Materia:
Produccion de carne

Grado:
8°

Grupo:
B

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de
enero de 2024..

CUADRO VACUNACIONAL

Bovinos:

- **Carbon sintomático**

Tipo: bacteriana

Edad: periodicidad a los 3-4 meses.

- **Septisemia hemorrágica**

Tipo: bacteriana

Edad: a los 4 meses

- **Derrienge**

Tipo: Virus inactivado

Edad: a los 4-5 meses

- **Carbón sintomático**

Tipo: bacteriana

Edad: revacunación a los 15-16 meses cada año

- **Septisemia hemorrágica**

Tipo: bacteriana

Edad: 10 días antes del embarque.

- **Rabia:** A los 3 meses de nacido cada año.



EQUINOS

- **Influenza equina:** a los 3 o 4 meses la primera dosis luego repetir a las 2 o 6 semanas. Refuerzo anual.
- **Tetanos:** 2,3 y 6 meses de edad. adultos una vez al año.
- **Adenitis equina:** 5 a 6 mese de edad. Animales adultos dosvacunaciones anuales.
- **Encefalitis equina:** a los 4 meses de edad. revacunación anual.
- **Gurma:** vacunar a los 4-6 meses, segunda dosis a las 12 meses, revacunación anual

PORCINOS:

- **Aftosa:** 42 días; primerizas; reproductoras yreproductores cada 6 meses.
- **Peste porcina:** 42 días ; primerizas; antes del parto; machos cada 6 meses
- **Rinitis Atrófica:** 7 días y refuerzo a los 28 días; primerizas, hembras en preparto y machos semestralmente.
- **Erisipela:** Destete, revacunación a los 21 días; prepar- to, machos cada 6 meses.
- **Enfermedad Aujeszky :** de 65 días de edad; hembras en preservicio, hembras en preparto; machos anualmente.
- **Diarrea por E. coli:** Hembras en preservicio, hembras en preparto; machos anualmente



OVINOS

- **Enterotoxemia:** primera dosis a los 6-8 semanas de edad. Segunda dosis 4 semanas después de la primera. Revacunación anual.
- **Ectigma contagioso:** primera dosis a los 6 mese de edad. Revacunacion anual.
- **Carbunco sintomático:** Primera dosis a los 3 meses de edad. Revacunación Anual.