



Nombre del alumno: Leonardo Rafael Pinto Santos

Nombre del profesor: Lopez Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: supernota

Materia: produccion de carne

Grado: 8

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas

Cuadros de vacunación del estado



Chiapas

1. Bovinos

- Carbunco Bacteridiano (Ántrax):
 - Primera dosis: A partir de los 3 meses de edad.
 - Revacunación: Anual.
- Clostridiosis (Enfermedades Clostridiales):
 - Primera dosis: A los 3 meses de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Anual.
- Leptospirosis:
 - Primera dosis: A los 4-6 meses de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Anual.
- Rabia:
 - Primera dosis: A los 3 meses de edad.
 - Revacunación: Anual.



Equinos

- Influenza Equina:
 - Primera dosis: A los 6 meses de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Cada 6 meses.
- Tétanos:
 - Primera dosis: A los 3 meses de edad.
 - Segunda dosis: 4-6 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Anual.
- Encefalomiелitis Equina:
 - Primera dosis: A los 3 meses de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Anual.



Cuadros de vacunación del estado



Chiapas

Porcinos

- Peste Porcina Clásica:
 - Primera dosis: A las 8-10 semanas de edad.
 - Revacunación: Anual.
- Mal Rojo (Erisipela):
 - Primera dosis: A las 8 semanas de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Cada 6 meses.
- Parvovirus Porcino (en hembras reproductoras):
 - Primera dosis: 5 semanas antes del servicio.
 - Segunda dosis: 2 semanas antes del servicio.
 - Revacunación: Antes de cada servicio.



Ovinos

- Enterotoxemia (Clostridiosis):
 - Primera dosis: A las 6-8 semanas de edad.
 - Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.
 - Revacunación: Anual.
- Carbunco Sintomático:
 - Primera dosis: A los 3 meses de edad.
 - Revacunación: Anual.
- Ectima Contagioso (Orf):
 - Primera dosis: A las 6 semanas de edad.
 - Revacunación: Anual.

