



Nombre de alumno:
Yazmin Lucero Gutierrez Sanchez

Nombre del profesor:
mvz. Jose Mauricio Padilla

Nombre del trabajo:
Supernota

Materia:
Produccion de carne

Grado:
8°

Grupo:
B

Comitán de Domínguez Chiapas

CUADRO VACUNACIONAL

BOVINOS

ENFERMEDAD	EDAD DE VACUNACIÓN	REVACUNACIÓN
Fiebre aftosa	Adultos y terneros desde los dos meses de edad	cada 6 meses
Carbón sintomático	machos y hembras desde los 3 meses	Al destete y cada año.
Rabia	A los 3 meses de nacido	cada año
Edema maligno y septicemia hemorrágico	Machos y hembras desde los tres meses	Al destete y cada año
Carbón bacteriano	Al año	Cada año
Brucelosis	Hembra entre 3 y 7 meses	Dosis Única



PORCINOS

VACUNA	EDAD
Aftosa	42 días: primerizas, reproductoras(es) cada 6 meses.
Peste porcina	42 días, primerizas, hembras antes del parto machos, cada 6 meses.
Rinitis Atrófica	7 días y refuerzo a los 28 días; primerizas, hembras en preparto y machos semestralmente.
Parvovirus	Hembras en Preservicio; a los 11 días postparto, machos cada 6 meses.
Leptospira	Destete; hembras en preservicio; 11 días postparto; machos cada 6 meses.
Erisipela	Destete, revacunación a los 21 días; preparto, machos cada 6 meses.
Enfermedad de Aujeszky	65 días de edad; hembras en preservicio, hembras en preparto; machos anualmente
Diarrea por E. coli	Hembras en preservicio, hembras en preparto; machos anualmente
Vermifugación	Al destete, todos los animales cada 2 a 3 meses .

EQUINOS

VACUNA

Encefalomiелitis equina: Los potrillos 2 dosis con 30 días de intervalo, luego revacunación anual.

Influenza equina: los potrillos a los 3 o 4 meses la primera dosis luego repetir a las 2 o 6 semanas. Refuerzo anual.

Tetanos: 2,3 y 6 meses de edad. adultos una vez al añ.

Adenitis equina: 5 a 6 mese de edad. Animales adultos dos vacunaciones anuales.

Rinoneumonitis equina: yeguas preñadas de 5 - 7 meses de gestación .



CUADRO VACUNACIONAL

OVINOS

ENFERMEDAD	EDAD DE VACUNACIÓN	REVACUNACIÓN
------------	--------------------	--------------

Enterotoxemia:	primera dosis a los 6-8 semanas de edad. Segunda dosis 4 semanas despues de la primera.	Revacunación anual.
----------------	--	---------------------

Carbunco sintomatico:	Primera dosis a los 3 meses de edad.	Revacunación Anual.
-----------------------	--------------------------------------	---------------------

Ectigma contagioso:	primera dosis a los 6 mese de edad.	Revacunacion anual
---------------------	-------------------------------------	--------------------

