



Cuadro Vacunacional UNIDAD I

GERARDO DE JESUS CERIBELLI SANTIAGO 8A

Vacunación para Bovinos

	Vacuna	Edad o momento de aplicación	Recomendaciones
0	Carbunco bacteridiano	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente
1	Clostridiosis (complejo clostridial)	2-3 meses de edad	Reforzar cada 6 meses en zonas de riesgo
2	Rabia parálitica	3 meses de edad	Anual, especialmente en áreas con alta incidencia
3	Brucelosis (cepa B19, hembras)	4-8 meses de edad	Solo hembras, obligatorio en campañas sanitarias
4	IBR (Rinotraqueitis infecciosa bovina)	6 meses de edad	Reforzar cada 6-12 meses
5	Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar anualmente
6	Fiebre aftosa (si aplica)	Según campañas nacionales	Aplicación determinada por la autoridad sanitaria

Vacunación para Equinos

	Vacuna	Edad o momento de aplicación	Recomendaciones
0	Tétanos	Desde los 3 meses de edad	Reforzar cada 12 meses
1	Influenza equina	6 meses de edad	Reforzar cada 6 meses en equinos en movimiento
2	Encefalitis equina (Venezolana)	3 meses de edad	Anual, especialmente en zonas de riesgo
3	Rabia	6 meses de edad	Anual, obligatorio en áreas con casos reportados
4	Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar cada 12 meses
5	Virus del Nilo Occidental	A partir de los 4 meses	Reforzar cada 6-12 meses

Vacunación para Porcinos

	Vacuna	Edad o momento de aplicación	Recomendaciones
0	Mycoplasma hyopneumoniae	7-10 días de vida	Reforzar según indicación veterinaria
1	Circovirus porcino (PCV2)	3-4 semanas de edad	Reforzar cada 6 meses en sistemas intensivos
2	Salmonella	6-7 semanas de vida	Opcional según riesgo
3	Pasteurella multocida	6-7 semanas de vida	Reforzar según brotes locales
4	Parvovirus porcino (cerdas)	Antes de la monta	Reforzar en cada gestación
5	Fiebre porcina clásica (si aplica)	Según campaña oficial	Obligatoriedad depende de la región

Vacunación para Ovinos

	Vacuna	Edad o momento de aplicación	Recomendaciones
0	Carbunco bacteridiano	A partir de los 3 meses	Reforzar anualmente
1	Clostridiosis (complejo C y D)	2-3 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
2	Enterotoxemia	6 semanas de edad	Reforzar según prevalencia local
3	Rabia	3 meses de edad	Anual en zonas de alta incidencia
4	Brucelosis	4-8 meses (hembras)	Según campañas sanitarias
5	Pasteurelisis	6 semanas	Reforzar cada 6-12 meses

BIBLIOGRAFIA

- Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. (2019). *Vacunas y bacterinas* . recuperado de gob.mx
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. (2017). *Calendario de Medicina Preventiva: Ovinos, Caprinos, Bovinos* . recuperado de Facultad de Medicina Veterinaria
- Club Ganadero. (2023). *¿Cómo realizar mi calendario de vacunación en bovinos?* . recuperado de Club ganadero