



Nombre de alumno: Carolina Yazareth Juarez Ruedas

Nombre del profesor: MVZ. Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: Cuadros de Vacunación en Chiapas

Materia: Producción Sustentable De Carne

Grado: 8°

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de enero 2025

CUADRO DE VACUNACIÓN EN BOVINOS

Clostridium: cada 6 meses

Derrienge: cada 6 meses

Virales: 1 vez al año

Leptospirosis: cada 3 meses

Desparasitación: cada 3 meses

Vitaminas: 2 veces al año.



CUADRO DE VACUNACIÓN EN EQUINOS

Influenza equina: a los 3 o 4 meses la primera dosis luego repetir a las 2 o 6 semanas.

Refuerzo anual. Tetanos: 2,3 y 6 meses de edad. adultos una vez al año.

Adenitis equina: 5 a 6 mese de edad. Animales adultos dosvacunaciones anuales.

Encefalitis equina: a los 4 meses de edad. revacunación anual.

Gurma: vacunar a los 4-6 meses, segunda dosis a las 12 meses, revacunación anual



CUADRO DE VACUNACIÓN EN CERDOS

PPC(peste porcina clásica):
sementales cada 6 meses, madres
a partir del último tercio de
gestación, chanchillas cada 6
meses, engorda 42 días.

Cirovirus: sementales cada 6
meses, madres cada 6 meses,
engorda 15 días y 30 días.



Parvovirus, leptospirosis, erisipela: sementales cada 6 meses,
madres quince días antes de la monta, chanchillas 170 días
primera dosis y 180 días revacunación.

Mycoplasma: sementales cada 6 meses, madres 100 días de
gestacion, chanchillas 70 días de gestacion, 100 días de
gestacion, engorda 7 días, 21 días.

CUADRO DE VACUNACIÓN EN OVINOS

Enterotoxemia: primera dosis a los 6-8 semanas de
edad.Segunda dosis 4 semanas despues de la primera.

Revacunación anual. Ectigma contagioso: primera dosis a los 6
mese de edad.

Revacunacion anual. Carbunco sintomatico: Primera dosis a
los 3 meses de edad.Revacunación Anual.

