



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Jaime Arturo Salinas Ham,

Nombre del tema: Cuadro de Vacunación en Grandes Especies

Parcial: 1° Unidad

Nombre de la Materia: Producción Sustentable de Carne

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 8° Cuatrimestre

CUADRO DE VACUNACIÓN DEL ESTADO CHIAPAS PARA BOVINOS, EQUINOS, PORCINOS Y OVINOS

Cuadro de Vacunación Bovinos de Leche

BECERROS

Las crías recién nacidas deben recibir una inmunización intranasal contra rinotraqueítis infecciosa bovina y parainfluenza bovina tipo 3 con Nasalgen (reg. SAGARPA B-0273-220), la cual actúa de manera local dando una rápida protección a temprana edad.

A partir de los 3 meses de vida se recomienda aplicar Bovilis Vista Once SQ (reg. SAGARPA B-0273-192), una vacuna que protege contra la IBR, PI3, diarrea viral bovina (DVB), virus respiratorio sincitial bovino, Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida.

A partir de la misma edad, también se sugiere administrar Bovilis RB-51 (reg. B-0273-290) para las infecciones causadas por Brucella abortus, además de un producto que las proteja de clostridiosis bovina como Covexin 10 (reg. SAGARPA B-0273-002), con una segunda dosis después de 4 a 6 semanas.

EQUINOS

EQUIVAC TC-83

Estimula la inmunidad activa contra el virus de la Encefalitis Equina Venezolana en equinos susceptibles clínicamente sanos, a partir de los tres meses de edad con revacunación anual.

PORCINOS

VACUNA CONTRA LA ERISPELA PORCINA

El cerdo debe recibir dos dosis, con tres o cuatro semanas de diferencia, comenzando desde la sexta a octava semana de edad. Se puede administrar de manera oral.

VACUNA CONTRA LA COLIBACILOSIS

La vacuna puede administrarse de manera oral en el agua de los cerdos antes del destete para prevenir la diarrea. Este proceso debe realizarse durante 18 días.

VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA POR MICOPLASMA

Para llevar a cabo este procedimiento es necesario que los lechones estén sanos y tengan un tiempo de vida de tres semanas. Vuelve a vacunarlos dos o tres semanas después.

VACUNA CONTRA LA RINITIS ATRÓFICA

Es necesario que administres la dosis vía intranasal entre el primer y tercer día de nacido.