



Nombre del alumno: Paola Elizabeth Maldonado Cancino

Nombre del profesor: MVZ. Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: cuadro de vacunación en en estado de Chiapas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos

Materia: producción de carne

Grado: 8°

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas, enero del 2025

CUADRO DE VACUNACIÓN

Bovinos y ovinos

VACUNAS EN BECERROS

Vacuna	Previene	Vía de Administración	Primera aplicación	Refuerzos	Especies y Dosis
Adbac Doble Bovina	<i>P. multocida</i> y <i>Clostridium chauvoei</i> .	Subcutánea o intramuscular	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 6 ó 12 meses	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac Triple Bovina	<i>P. multocida</i> tipos A y D, <i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> .	Subcutánea o intramuscular	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 6 ó 12 meses	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 7 vías	<i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos C, D y B.	Subcutánea o intramuscular	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 6 ó 12 meses	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 8 vías	<i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos B, C y D, <i>P. multocida</i> , <i>M. haemolytica</i> tipo A1, <i>E. coli</i> .	Subcutánea o intramuscular	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 6 ó 12 meses	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 11 vías	<i>P. multocida</i> tipos A y D, <i>M. haemolytica</i> , <i>Histophilus somni</i> , <i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos C y D.	Subcutánea o intramuscular	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 6 ó 12 meses	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac Fiebre Carbonosa	Ántrax o Fiebre Carbonosa.	Subcutánea	A partir de los 3 meses de edad	A los 21 días, y cada 12 meses. O aplicar si hay algún brote en la zona.	Bovinos 2 mL Ovinos y caprinos 1 mL

VACUNAS EN ADULTOS

Vacuna	Previene	Vía de Administración	Refuerzos	Especies y Dosis
Adbac Doble Bovina	<i>P. multocida</i> y <i>Clostridium chauvoei</i> .	Subcutánea o intramuscular	Como refuerzo 15 días previos a la movilización de los animales. Aplicar antes de la temporada de lluvias y frío.	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac Triple Bovina	<i>P. multocida</i> tipos A y D, <i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> .	Subcutánea o intramuscular	Cada 6 ó 12 meses, según la incidencia de la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvias y frío. Como refuerzo 15 días previos a la movilización de los animales.	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 7 vías	<i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos C, D y B.	Subcutánea o intramuscular	Cada 6 ó 12 meses, según la incidencia de la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvias. Como refuerzo ante un brote cercano de Clostridiasis de las contenidas en la fórmula.	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 8 vías	<i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos B, C y D, <i>P. multocida</i> , <i>M. haemolytica</i> tipo A1, <i>E. coli</i> .	Subcutánea o intramuscular	Como refuerzo 15 días previos a la movilización de los animales. Para mejorar el calostro y prevenir diarreas en becerros, aplicar 30 días antes del parto. Como refuerzo ante un brote cercano de Clostridiasis de las contenidas en la fórmula. Aplicar antes de la temporada de lluvias y frío.	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac 11 vías	<i>P. multocida</i> tipos A y D, <i>M. haemolytica</i> , <i>Histophilus somni</i> , <i>C. chauvoei</i> , <i>C. septicum</i> , <i>C. novyi</i> , <i>C. sordellii</i> , <i>C. perfringens</i> tipos C y D.	Subcutánea o intramuscular	Cada 6 ó 12 meses, según la incidencia de la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvias y frío.	Bovinos 5 mL Ovinos y caprinos 2.5 mL
Adbac Fiebre Carbonosa	Ántrax o Fiebre Carbonosa.	Subcutánea	Cada 12 meses o aplicar si hay algún brote en la zona. Aplicar antes de la temporada de lluvias.	Bovinos 2 mL Ovinos y caprinos 1 mL

Cerdos

Categoría	Vacuna	Enfermedad	Dosis	Frecuencia	Edad	Modo de aplicación	Peso Lb
Reemplazos	RESPISURE	Micoplasma	2 ml	Dos dosis con intervalo de 14 días	150 y 164 días	Intramuscular	133
	FARROW SURE	Parvovirus, Leptospira y Erisipela	5 ml	Dos dosis con intervalo de 14 días	150 y 164 días	Intramuscular	140-154
	RELSURE	Circovirus	2 ml	Dos dosis con intervalo de 14 días	164 y 178 días	Intramuscular	
	LITTER GUARD	<i>E. Coli</i> y clostridium	2 ml	Dos dosis	85 y 100 de gestación	Intramuscular	
Cerdas paridas	FARROW SURE	Parvovirus, Leptospira y Erisipela	5 ml	14 días después del parto	Cerdas paridas	Intramuscular	
Hembras gestantes	LITTER GUARD	<i>E. Coli</i> y clostridium	2 ml	Día 100 de gestación	Cerdas gestantes	Intramuscular	
	Dectomax	Desparasitante	1cc/70 Lb	100 días	70 días de preñez	Intramuscular	
	RESPISURE	Micoplasma	2 ml	Día 100 de gestación	Cerdas gestantes	Intramuscular	
Machos engorde	INNOSURE	Inmunocastración	2ml	Dos dosis con intervalo de 4 semanas	Semanas 12 y 16	Subcutánea	
Lechones	RESPISURE	Micoplasma	2 ml	Dos dosis con intervalo de 14 días	7 Y 21 días	Intramuscular	
	RELSURE	Circovirus	2 ml	Dos dosis con intervalo de 14 días	21 Y 35 días	Intramuscular	21-35
Verracos	RESPISURE	Micoplasma	2 ml	Una dosis	Cada 6 meses	Intramuscular	
	FARROW SURE	Parvovirus, Leptospira y Erisipela	5 ml	Una dosis	Cada 6 meses	Intramuscular	

CUADRO DE VACUNACIÓN

Equinos

Enfermedad Vacuna	Neonatos/Potrillos	Añeros	Caballos de alto Rendimiento	Caballos de Paseo	Yeguas reproductoras	Observaciones
Influenza Equina	Vacuna Inactivada: Primera dosis a los 6 meses, segunda dosis a los 7 meses y tercera dosis a los 8 meses.	Revacunación cada 6 meses	Vacunación cada 6 meses solicitada por la Federación de Hipódromos de las Americas			
Virus del Oeste del Nilo	Primera dosis a los 6 meses de edad. Segunda dosis a los 30 días. Tercera dosis a 6 meses en zonas endémicas.	Revacunación anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Revacunación anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Revacunación anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Revacunación anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Vacunación anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses. Vacunar cada primavera
Encefalitis Equina Venezolana	Primera dosis a los 4 meses. Revacunación anual.	Revacunación anual en la primavera.	En caso de requerirse vacunar 4 a 6 semanas antes del parto. En caso de brote vacunar a las yeguas gestantes y a todos los equinos de la región.			
Rinoneumonitis (HVE-1, HVE-4)	Primera dosis a los 2 o 4 meses de edad, revacunar a los 3 meses y al año.	Revacunación cada 3 o 4 meses, despues anual.	Revacunación cada 3 o 4 meses, despues anual.	Revacunación cada 3 o 4 meses, despues anual.	Revacunación cada 3 o 4 meses, despues anual.	Vacunar antes de la monta, cada 6 meses (yeguas y sementales).. En gestantes vacunar a lo 5,7 y 9 meses. En gestantes durante los 3,5,7 y 9 meses en zonas de alto riesgo.
Rabia	vacunadas, primera dosis a los 3 o 4 meses. Segunda dosis a los 12 meses. Potros de yeguas vacunadas, primera dosis a los 6 meses, segunda dosis a los 7 meses, tercera dosis a los 12 meses	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	No vacunar a hembras gestantes. No Vacunar caballos con virus vivo modificado. En caso de brote vacunar a todos los animales.
Gurpa (Paperas)	Inyectable: Primera dosis a los 4 o 6 meses, segunda dosis a los 5 o 7 meses, tercera dosis a los 7 u 8 meses, cuarta dosis a los 12 meses. Vacuna intranasal: Primera dosis a los 6 o 9 meses, segunda dosis a las 3 semanas después.	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Semi anual con una dosis de proteína M inactivada, 4 o 6 semanas antes del parto. En caso de brote vacunar con intranasal.
Tétanos	Potros de yeguas no vacunadas, primera dosis a los 3 o 4 meses. Segunda dosis a los 4 o 5 meses. Potros de yeguas vacunadas, primera dosis a los 6 meses, segunda dosis a los 7 meses, tercera dosis a los 8 o 9 meses	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunación anual, refuerzo cuando se inmuniza por primera vez. En caso de heridas y cirugía si no ha sido vacunado en los 6 últimos meses.