



**Nombre de alumno: Gpe. Del Carmen
Sánchez Aguilar**

**Nombre del profesor: MVZ. José
Mauricio Padilla Gómez**

Nombre del trabajo: Supernota

**Materia: Producción sustentable en
carne**

Grado: Octavo semestre

VACUNACIÓN EN PORCINOS

VACUNA	EDAD DE APLICACION	RECOMENDACIONES
Mycoplasma hyopneumoniae	7-10 días de vida	Segun indicaciones veterinari
Salmonella	6-7 semanas de vida	Opcional según el riesgo
Parvovirus porcino	Antes de la monta	Reforzar cada gestación
Fiebre porcina	Segun campaña oficial	Obligatorio depende de la ocasión
Pasteurella multocida	6-7 semanas de vida	Reforzar brotes locales

VACUNACION EN EQUINOS

Vacuna	Edad de aplicación	Recomendaciones
Tétanos	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente
Rabia	6 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
Encefalitis Equina	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente
Influenza equina	A partir de los 6 meses de edad	Reforzar casa 6 meses
Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar cada 12 meses de edad, anualmente

VACUNACION EN BOVINOS

VACUNA	EDAD DE APLICACION	RECOMENDACIONES
Crostitidiosis	2-3 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
Rabia	3 meses de edad	Aplicar anualmente
Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar anualmente
Fiebre aftosa	Según campañas nacionales	Aplicación determinada por la autoridad sanitaria
Carbunco bacteridiano	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente