



Nombre de alumno: Mariana Aguilar Jiménez

Nombre del profesor: MVZ. Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: Cuadros De Vacunación En Chiapas

Materia: Producción Sustentable De Carne

Grado: 8°

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de enero 2025

BOVINOS

Carbon sintomático Tipo: bacteriana Edad: periodicidad a los 3-4 meses.

Septisemia hemorrágica Tipo: bacteriana Edad: a los 4 meses

Derrienge Tipo: Virus inactivado Edad: a los 4-5 meses

Carbón sintomático Tipo: bacteriana Edad: revacunación a los 15-16 meses cada año S

epitsemia hemorrágica Tipo: bacteriana Edad: 10 días antes del embarque.

Rabia: A los 3 meses de nacido cada año.



EQUINOS

Tétano: Serie de tres dosis a los 6, 7 y 9 meses de edad

Encefalitis: La vacuna de la encefalitis equina venezolana es una sola vacuna o en combinación con encefalitis equina del este y del oeste.

Influenza: Los potros jóvenes de yeguas vacunadas, debido a los anticuerpos maternos, deben vacunarse a los 9, 10 y 12 meses de edad

Rabia: Las yeguas deben vacunarse 4-6 semanas antes del parto

Herpes virus equino 1 y 4: administrar una vacuna muerta contra el HVE-1 a las yeguas gestantes a los 3, 5, 7 y 9 meses de gestación



PORCINOS

Aftosa: 42 días; primerizas; reproductoras y reproductores cada 6 meses.

Peste porcina: 42 días ; primerizas; antes del parto; machos cada 6 meses

Rinitis Atrófica: 7 días y refuerzo a los 28 días; primerizas, hembras en parto y machos semestralmente.

Erisipela: Destete, revacunación a los 21 días; parto, machos cada 6 meses.

Enfermedad Aujeszky : de 65 días de edad; hembras en preservicio, hembras en parto; machos anualmente.

Diarrea por E. coli: Hembras en preservicio



OVINOS

Al nacer: Vacuna contra el Tétanos y Enterotoxemia

Enterotoxemia: primera dosis a los 6-8 semanas de edad. Segunda dosis 4 semanas después de la primera.

Revacunación anual. Ectigma contagioso: primera dosis a los 6 meses de edad.

Carbunco sintomático: Primera dosis a los 3 meses de edad. Revacunación Anual.

