



Nombre del Alumno: Erick Peñaloza Martínez

Nombre del tema: Súper Nota

Parcial: 1º

Nombre de la Materia: Producción sustentable en carne

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Aguilar

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 8º

CUADRO DE VACUNACIÓN

Equinos

VACUNACION EN EQUINOS

Vacuna	Edad de aplicación	Recomendaciones
Tétanos	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente
Rabia	6 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
Encefalitis Equina	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente
Influenza equina	A partir de los 6 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar cada 12 meses de edad, anualmente

Porcinos

VACUNACIÓN EN PORCINOS

VACUNA	EDAD DE APLICACION	RECOMENDACIONES
Mycoplasma hyopneumoniae	7-10 días de vida	Segun indicaciones veterinari
Salmonella	6-7 semanas de vida	Opcional según el riesgo
Parvovirus porcino	Antes de la monta	Reforzar cada gestación
Fiebre porcina	Segun campaña oficial	Obligatorio depende de la ocasión
Pasteurella multocida	6-7 semanas de vida	Reforzar brotes locales

Bovinos

VACUNACION EN BOVINOS

VACUNA	EDAD DE APLICACION	RECOMENDACIONES
Crostitidosis	2-3 meses de edad	Reforzar cada 6 meses
Rabia	3 meses de edad	Aplicar anualmente
Leptospirosis	6 meses de edad	Reforzar anualmente
Fiebre aftosa	Segun campañas nacionales	Aplicación determinada por la autoridad sanitaria
Carbunco bacteridiano	A partir de los 3 meses de edad	Reforzar anualmente