



Licenciatura en Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Reyna González David Antonio

Patologías y Técnicas Quirúrgicas en Porcinos.

Super nota "Salmonellosis Porcina"

MVZ. García Sedano Barreda Roberto

"5 °. B"

Viernes 14 de febrero del 2025

PORCINA

1

ETIOLOGIA

Los agentes etiológicos más frecuentes en la salmonellosis son *Salmonella Typhimurium* y *Salmonella Enteritidis*



2

TRANSMISION


La salmonellosis porcina se transmite por contacto directo con animales infectados o con heces contaminadas. También se puede transmitir por el aire a través de polvo y aerosoles.



3

TRATAMIENTO

- Antibióticos como tiamulina, valnemulina, tilosina, tilvalosina y lincomicina.
- Antidiarreicos.
- AntiHistaminicos como Dexametazona, etc.



4

PREVENCION

- Mejorar la higiene y desinfección.
- Manejo todo-dentro/todo-fuera.
- Controlar a los roedores.



5

SIGNOS CLINICOS

- Diarrea.
- Fiebre.
- Depresión.
- Neumonía.
- Meningitis.
- Artritis.



BIBLIOGRAFÍAS:

https://www.google.com/search?q=salmonelosis+porcina+tx&sca_esv=56417a62b6402fda&rlz=1C1CHBF_esMX1064MX1064&sxsrf=AHTn8zryP78Bi9YQOua3IP0Ouozi2_J4Fw%3A1739586418158&ei=cvuvZ-

[W4CbTgkPIP6cWTyAg&ved=0ahUKEwjluyq00MSLaxU0MEQIHeniBlkQ4dUDCBM&uact=5&oq=salmonelosis+porcina+tx&gs_l=egxnd3Mtd2l6LXNlcnAif3NhbG1vbmVsb3NpcyBwb3JjaW5hIHR4MgUQIRigAUjjIVDUB1iLH3ACeAGQAQGYAaICoAGREKobBTauOS4yuAEDyAEA-AEBmAlJoAKu8ICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIxgnwgIIEAAYgAQYogTCAGUQABjvBclCBRAAGIAEwglKECMYgAQYJxiKBclCBhAAGBYHpgDAIlgGAZAGCJIHBzluNi4wLjGgB-A2&sclient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=salmonelosis+porcina+tx&gs_l=egxnd3Mtd2l6LXNlcnAif3NhbG1vbmVsb3NpcyBwb3JjaW5hIHR4MgUQIRigAUjjIVDUB1iLH3ACeAGQAQGYAaICoAGREKobBTauOS4yuAEDyAEA-AEBmAlJoAKu8ICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIxgnwgIIEAAYgAQYogTCAGUQABjvBclCBRAAGIAEwglKECMYgAQYJxiKBclCBhAAGBYHpgDAIlgGAZAGCJIHBzluNi4wLjGgB-A2&sclient=gws-wiz-serp)

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_ficha_tecnica_salmonelosis.pdf