

Nombre del Alumno: Cecilia Guadalupe Gómez Morales

Nombre del tema: Infecciones Gastrointestinales

Parcial: I<sup>a</sup>

Nombre de la Materia: Patología del niño y adolecente

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz

Nombre de la Licenciatura: Enfermería I

Cuatrimestre: 5<sup>a</sup>

Lugar y Fecha de elaboración: A 04 de abril del 2025

En Pichucalco Chiapas.



Infección por Helicobacter Pylori Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa con forma de bacilo helicoidal capaz de instaurarse y proliferar en la capa mucosa que reviste el interior del estómago del ser humano.

Como prevenir :

Ingerir alimentos bien

cocinados ,

Evitar lugares antihigieniscos, lavar bien las manos etc

Infección por Norovirus

Norovirus es un género de virus ARN pertenecientes a la

familia Caliciviridae. Este grupo vírico es la Causa

global más común de la gastroenteritis aguda y provoca unos 685 millones de casos al año.

La infección por *Norovirus* suele cursar con síntomas como diarrea líquida, náuseas, vómitos, calambres abdominales, febrícula, sensación de indisposición general y dolores musculares.

Lavar las manos con agua y javon

Infecciones Gastrointestinales

Infección por rotavirus

La infección por el género vírico *Rotavirus* es la causa más prevalente de deshidratación severa por diarrea en niños menores de 5 años

Como prevenir: colocandonas las vacunas contra el rotavirus es la mejor manera de proteger a su hijo o hija

Salmonelosis

La salmonelosis es una de las infecciones gastrointestinales más conocidas en la población general. Causada por bacterias del género Salmonella, este cuadro infeccioso es el segundo agente causal más común de infección gastrointestinal

Como prevenir:

Lavandse bien las manos puede ayudar a prevenir la transferencia de la bacteria de la salmonela

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 2



campilobacteriosis La es una enfermedad gastrointestinal provocada Cocinar todo tipo de carne por bacterias del Capilobacteriosis género Campylobacter. Este grupo completo bacteriano es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis en regiones de alto ingreso, siendo responsable de un 5 a un 14 % de los cuadros totales. higella es un género de bacterias con forma Lavándote las manos con **Shigellosis** de bacilo que pertenecen а frecuencia usualmente después familia Enterobacteriaceae. Este grupo de de cambiar un pañal o después patógenos se consideran altamente de salir del baño. contagiosos e ingerir de forma accidental pequeñas cantidades de bacterias en los alimentos es suficiente para que se produzca el cuadro sintomático. Tomar precauciones con los alimentos y el agua, practicar Es el caso de la amebiasis, provocada **Amebiasis** por Entamoeba histolytica, un protozoo una buena higiene de las con forma ameboide que adopta distintas manos y evitar la exposición morfologías según su fase del ciclo vital. fecal durante la actividad sexual

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 3



## Referencia Bibliográfica

https://vivolabs.es/10-infecciones-gastrointestinales-comunes/

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/enfermedades-gastrointestinales

https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/enfermedades-gastrointestinales/

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 4