



**Nombre del alumno: Marvin
Alejandro Palomeque Cornelio**

**Tema: Atención al niño con
problemas traumáticos.**

4to. Parcial.

**Docente: LEO. Alfonso Velasquez
Ramírez**

**Materia: Patología del niño y
adolescentes.**

**Licenciatura en enfermería.
5to Cuatrimestre**

ATENCIÓN DEL NIÑO CON PROBLEMAS TRAUMÁTICOS Y DE INTOXICACIÓN.


¿CUÁLES SON SUS ORÍGENES?



LOS PROBLEMAS TRAUMÁTICOS PUEDEN SER FÍSICOS O PSICOLÓGICOS, Y PUEDEN SER CAUSADOS POR EVENTOS COMO MALTRATO, VIOLENCIA, ACCIDENTES, O SITUACIONES DE GUERRA.


EJEMPLOS DE PROBLEMAS TRAUMÁTICOS.

LOS EJEMPLOS DE EPISODIOS TRAUMÁTICOS QUE SE EXPERIMENTAN UNA Y OTRA VEZ SON LOS SIGUIENTES:
MALTRATO FÍSICO O EMOCIONAL.
ABUSO SEXUAL.
VIOLENCIA ENTRE PANDILLAS.
GUERRA.
EVENTOS TERRORISTAS.



DATO CURIOSO #1	DATO CURIOSO #2	DATO CURIOSO #3
EL TRAUMA PUEDE SER DESENCADENADO POR ACONTECIMIENTOS QUE AMENAZAN LA VIDA O PROVOCAN LESIONES GRAVES.	ALGUNAS INVESTIGACIONES ESTIMAN QUE DEL 60 AL 75 POR CIENTO DE LAS PERSONAS EN NORTEAMÉRICA EXPERIMENTAN UN EVENTO TRAUMÁTICO EN ALGÚN MOMENTO.	LOS EVENTOS TRAUMÁTICOS PUEDEN SER EVENTOS AISLADOS, O CONTINUOS O REPETIDOS. UNA PERSONA TAMBIÉN PUEDE EXPERIMENTAR UN TRAUMA DESPUÉS DE HABER PRESENCIADO ALGO TRAUMÁTICO EN OTRA PERSONA.

SÍNTOMAS DE PROBLEMAS TRAUMÁTICOS.




LOS SÍNTOMAS DE PROBLEMAS TRAUMÁTICOS PUEDEN INCLUIR:
EMOCIONES NEGATIVAS: SENTIR MIEDO, IRA, CULPA, VERGÜENZA, ANSIEDAD, NERVIOSISMO, O ESTAR IRRITABLE
EVITAR: EVITAR PERSONAS, LUGARES, O SITUACIONES QUE RECUERDEN EL TRAUMA
HIPERVIGILANCIA: ESTAR ATENTO AL PELIGRO, SENTIRSE SOBRESALTADO, O TENER DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE
DIFICULTAD PARA DORMIR: TENER PESADILLAS, TENER DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO, O TENER PROBLEMAS PARA PERMANECER DORMIDO

MEMORIA: TENER PROBLEMAS DE MEMORIA, O REVIVIR EL HECHO TRAUMÁTICO
AISLAMIENTO: SENTIRSE DISTANCIADO DE AMIGOS Y FAMILIARES, O TENER DIFICULTAD PARA SENTIR EMOCIONES POSITIVAS
REACCIONES FÍSICAS: TENER DOLORES DE CABEZA, SÍNTOMAS DIGESTIVOS, FATIGA, ACELERACIÓN DEL RITMO CARDÍACO, O SUDORACIÓN
AUTOAGRESIÓN: CORTARSE, ARRANCARSE EL PELO, O ARAÑARSE LA PIEL

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:


INTOXICACIÓN ALIMENTARIA:
•DIARREA, CON O SIN SANGRE
•DOLOR DE ESTÓMAGO Y CALAMBRES ABDOMINALES
•FIEBRE
•DOLOR DE CABEZA
•NÁUSEAS Y VÓMITOS
•DEBILIDAD

OTROS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
PUPILAS MUY GRANDES O MUY PEQUEÑAS
LATIDOS CARDÍACOS RÁPIDOS O MUY LENTOS
RESPIRACIÓN RÁPIDA O MUY LENTA
BOCA MUY SECA O BABEO
SOMNOLENCIA O HIPERACTIVIDAD
CONFUSIÓN
MALA ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE



TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

¿QUÉ ES?



EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE DAÑO CEREBRAL Y ES UNA LESIÓN CEREBRAL DE ORIGEN TRAUMÁTICO. EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO IMPLICA UNA AFECTACIÓN EN ENCÉFALO A CAUSA DE UN TRAUMATISMO EN EL CRÁNEO.

FISIOPATOLOGÍA:

LA FISIOPATOLOGÍA DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) SE CARACTERIZA POR ALTERACIONES ANATÓMICAS Y FUNCIONALES DEL CEREBRO Y SUS ENVOLTURAS. ESTAS ALTERACIONES PUEDEN SER PERMANENTES O TRANSITORIAS.



MECANISMO DE LESIÓN:

UN MOVIMIENTO REPENTINO DE LA CABEZA PUEDE HACER QUE EL CEREBRO REBOTE O SE RETUERZA EN EL CRÁNEO. LA LESIÓN DIRECTA DEL TEJIDO CEREBRAL PUEDE ALTERAR LA FUNCIÓN CEREBRAL DE FORMA INMEDIATA. LESIONES POSTERIORES PUEDEN PRODUCIRSE POR UNA CASCADA DE ACONTECIMIENTOS QUE SE INICIA TRAS LA LESIÓN INICIAL.

FISIOPATOLOGÍA SECUNDARIA:

SANGRADOS, EDEMAS, HIPEREMIA, TROMBOSIS Y OTROS PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS SECUNDARIOS. HEMATOMA INTRACRANEANO, EPIDURAL O SUBDURAL. EDEMA CEREBRAL. HIPOXIA Y/O HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL.

SECUELAS:

LOS EVENTOS TRAUMÁTICOS PUEDEN SER EVENTOS AISLADOS, O CONTINUOS O REPETIDOS. UNA PERSONA TAMBIÉN PUEDE EXPERIMENTAR UN TRAUMA DESPUÉS DE HABER PRESENCIADO ALGO TRAUMÁTICO EN OTRA PERSONA.

ETIOLOGÍA:



EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) SE PRODUCE POR UN IMPACTO VIOLENTO EN LA CABEZA O EL CUERPO, QUE PUEDE LESIONAR EL CEREBRO. LAS CAUSAS MÁS COMUNES SON: ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CAÍDAS, LESIONES DEPORTIVAS, AGRESIONES, ACCIDENTES LABORALES O DOMÉSTICOS, LESIONES PENETRANTES.

EL TCE PUEDE OCURRIR A LO LARGO DE TODA LA VIDA. CAUSAS EN DIFERENTES EDADES EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, LAS CAÍDAS SON LA CAUSA MÁS FRECUENTE. EN NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS, LAS CAUSAS HABITUALES SON ACCIDENTES DE TRÁFICO, BICICLETA O DEPORTE. EN ADULTOS DE EDAD AVANZADA, LAS CAÍDAS SON UNA CAUSA FRECUENTE.

CUADRO CLÍNICO.

EL CUADRO CLÍNICO DE UN TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) DEPENDE DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN Y DE SU LOCALIZACIÓN. LOS SÍNTOMAS PUEDEN APARECER DE INMEDIATO O DESARROLLARSE CON LENTITUD.

SÍNTOMAS LEVES
DOLOR DE CABEZA
MAREO
CONFUSIÓN
VISIÓN BORROSA
ZUMBIDO EN LOS OÍDOS
DETERIORO DE LA MEMORIA
NÁUSEAS O VÓMITOS
FATIGA O SOMNOLENCIA
PROBLEMAS CON EL HABLA
HIPERSENSIBILIDAD A LA LUZ O AL SONIDO

SÍNTOMAS MÁS GRAVES
PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO
AGRANDAMIENTO DE LA PUPILA
ENTUMECIMIENTO U HORMIGUEO EN LOS BRAZOS O LAS PIERNAS
AUMENTO DE LA CONFUSIÓN, EL DESASOSIEGO O LA AGITACIÓN
RIGIDEZ DE NUCA
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
DETERIORO DE LA CONCIENCIA

Referencia bibliografica:

https://www.google.com/search?q=fisiopatolog%C3%ADa+traumatismo+craneoencefal%C3%A1lico&client=ms-android-americanamovil-mx-revc&sca_esv=4495519a67c9d9b8&sxsrf=AHTn8zpDOIpHoUmNv71jQFVrzUWpbu5Xag%3A1744090956661&ei=TLf0Z7uSKLCfwN4Pyc6o6AU&oq=fisiopatolog%C3%ADa+traumatismo+craneoencefal%C3%A1lico&gs_l=pbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwli1maXNpb3BhdG9sb2fDrWEgdHJhdW1hdGlzbW8gY3JhbmVvZW5jZWbDoWxpY28yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAgYHjIIEAAYgAQYogRIp4EBULFDWPR5cAN4AZABAJgBzwWgAZ4SqqgELMC4zLjMuMS42LTG4AQPIAQD4AQGYAgagAuMQwglHECMYsAIYJ8ICBxAAGIAEGA3CAggQABgHGAAYHsICCBAAGAUYBxgewglFEAAY7wWYAwCIBgGSBwswLjEuMi4yLjAuMaAHqTyBwswLjEuMi4yLjAuMbgH4xA&sclient=mobile-gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=cuadro+cl%C3%ADnico+de+traumatismo+craneoencefal%C3%A1lico&oq=&gs_l=crp=EgZjaHJvbWUqCQgBECMYJxjqAjlHCAAQRRiwATIjCAEQIxgnGOoCMgkIAhAjGCcY6glyCQgDECMYJxjqAjlJCAQQIxgnGOoCMgkIBRAjGCcY6glyCQgGECMYJxjqAjlJCAcQIxgnGOoCMgkICBAjGCcY6glyCQgJECMYJxjqAjlJCAoQIxgnGOoCMgkICxajGCcY6glyCQgMECMYJxjqAjlJCA0QIxgnGOoCMgkIDhAjGCcY6glyEQgPEAAYAxhCGI8BGLQCGOoCMhEIEBAAGAMYQhiPARI0AhjqAjlIRCBEQABgDGEIYjwEYtAIY6glyEQgSEAAYAxhCGI8BGLQCGOoCMhEIEAAGAMYQhiPARI0AhjqAtIBBi0xajBqN6gCFLACAFEFmQFhsfKU7PA&client=ms-android-americanamovil-mx-revc&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
<https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/que-es-trauma#causas>
<https://www.aepap.org/sites/default/files/>