

ENFERMERÍA CLÍNICA II



ARRITMIAS

Profesor: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ
Alumna: ODALIS GARCIA GOMEZ

Quinto Cuatrimestre
Grupo "A"

LIC. ENFERMERIA

ARRITMIAS

Se considera como arritmia a toda alteración del ritmo sinusal normal, una situación que se ve con suma frecuencia en los servicios de urgencia hospitalarios.

Lugar en el que se encuentra las arritmias

FC

Bradiarritmias
Fc < 60 Lpm

Taquicardia
100 Lpm

Supra ventricular
(arriba de los ventrículos)

Infra ventricular
(debajo de los ventrículos)





Latido anormal rápido o errático que afecta las cavidades superiores del corazón.

- Fibrilación ventricular.
- Taquicardia ventricular sin pulso.

- Bloqueos 1y2.
- Bloqueo 1:** segundo grado.
 - Frecuencia cardiaca de bajo de 60
 - Intervalo PQ se van alargando hasta que no conduce una.
- Bloqueo 2:**
 - Frecuencia cardiaca de bajo de 60
 - Intervalo PQ normal y varias P q no conducen.
- Bloqueo completo.

- Fibrilación auricular.
- Flutter auricular.
- Taquicardia supra ventricular.
- Taquicardia sinusal.
- Taquicardia ventricular con pulso.

ECG and electrical activity of the myocardium



Taquicardia

Causas

- Anomalías congénitas del corazón
- Tumor adrenal en exceso
- El consumo de cocaína y otros drogas recreativas
- El desequilibrio de electrolitos
- Alta enfermedad cardíaca
- Diabetes
- Estrés psicológico o ansiedad
- Hipertensión
- Enfermedades pulmonares

Síntomas

- Cuando el corazón late demasiado rápido, varios órganos y tejidos se quedan sin oxígeno, causando los siguientes síntomas:
- Falta de aire
- Aturdimiento
- Pulso acelerado
- Hinchazón, cansancio (debido del corazón)
- Desmayos
- Dolor en el pecho

Prevencción de la taquicardia

- Es importante tomar medidas para prevenirla, ya que es posible que se sufran otros tipos de arritmias.
- Hacer ejercicio
- Mantener bajo control la presión arterial y los niveles de colesterol
- Controlar el estrés


¿Qué hacer al momento de una taquicardia?

- Aplica agua fría sobre la cara, ojos y brazos por unos segundos
- Bebe una infusión de té verde
- Toma, valiente o pasiflora
- Toma la cafeína, teobalmina, ginseng, ajonjolí y ajo.
- Acuéstate boca arriba, presiona ligeramente con la palma de la mano y realiza un automasaaje en el pecho con movimientos circulares cada 1 minuto.
- Importante la respiración profunda y la relajación.

Fuente: Farmacias y Herbolos La Vengadora

Bristol Myers Squibb

MSP



BIBLIOGRAFIA

5b3c47cf2e59523edabd156d003b1674-LC-LEN501 ENFERMERIA CLINICA II