



NOMBRE DEL ALUMNO

KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL ALUMNO

MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

MATERIA

ENFERMERIA CLINICA II

TEMA

DIALISIS PERITONIAL

CUATRIMESTRE Y GRUPO

5-A

FEVHA DE ENTREGA

05/04/2025

DIALISIS PERITONIAL

1

DEFINICION

es una modalidad de tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en eliminar el exceso de toxinas y de líquidos del organismo a través de la membrana natural que recubre los órganos de la cavidad abdominal, el peritoneo.

2

CLASIFICACION

*Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA)

-Se realiza de forma manual

-Los intercambios se realizan habitualmente cuatro veces al día

-El dializado permanece en el abdomen unas cuatro horas cada vez

*Diálisis peritoneal automatizada (DPA)

-Se realiza con una máquina que drena el líquido dentro y fuera del abdomen

-Los intercambios se realizan durante la noche, generalmente de 9 a 12 horas

-Existen dos tipos de DPA: intermitente y nocturna

3

TIPOS

DPCA

El paciente lleva líquido en el abdomen durante las 24 horas

El paciente recambia el líquido de forma manual entre 3 y 5 veces al día

El paciente puede adaptar sus tratamientos a su estilo de vida

DPA

La máquina controla el tiempo para efectuar los intercambios necesarios

La máquina drena la solución utilizada e introduce la nueva solución de diálisis en el abdomen

El paciente puede realizar la diálisis por la noche, mientras duerme

4

MANEJO

-Colocar el catéter en el abdomen.

-Preparar la solución de diálisis.

-Introducir la solución de diálisis en el abdomen.

-Dejar la solución en el abdomen durante el tiempo de permanencia.

-Drenar la solución de diálisis.

Preparar la solución de diálisis para el siguiente intercambio

Para evitar infecciones, se debe cuidar el catéter. Se debe evitar mojarlo o que entre en contacto con cuerpos extraños.

Si se presentan síntomas como fiebre, temblores, dolor corporal o sensación extrema de frío, se debe avisar al servicio de urgencias.

5

TECNICA

-Se inserta un catéter suave en la cavidad abdominal.

-Se llena el catéter con una solución de diálisis que contiene un azúcar que extrae desechos y líquido.

-El desecho y el líquido pasan a la solución a través del peritoneo.

-Se drena el líquido en una bolsa estéril.

-Se vacía la bolsa por la mañana.

LINK DE LA IMAGEN

https://www.canva.com/design/DAGj0tExr14/vjbnxTPXKmBnwax6RNRVxA/edit?utm_content=DAGj0tExr14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

BIBLIOGRAFIA

ANTOLOGIA DE ENFERMERIA CLINICA II 2025 UDS.PDF

[5b3c47cf2e59523edabd156d003b1674-LC-LEN501 ENFERMERIA CLINICA II.pdf](#)