



**Nombre:**

Gloria Yazmin Hernández García.

**Tema:**

Arritmias

**Materia:**

Enfermería clínica II

**Docente:**

Marcos Jhodany Arguello Galvez.

**Licenciatura:**

Licenciatura en enfermería general.

**Cuatrimestre:**

5to. Cuatrimestre.

# Arritmias

¿Cómo se clasifican?

según la frecuencia  
cardiaca

según el lugar donde se  
dan

Bradiarritmias

Taquiarritmias

supraventriculares

infraventriculares

con una frecuencia  
cardiaca de 60 o menos  
de 60 latidos por minuto

con una frecuencia  
cardiaca de 100 o menos  
de 100 latidos por minuto

se dan por arriba de los  
ventriculos

se dan por debajo de los  
ventriculos

puede ser un bloqueo de  
tipo 1 o 2 o bloqueo  
completo

- Fibrilación auricular
- Flutter auricular
- Taquicardia supraventricular
- Taquicardia sinusal
- Taquicardia ventricular con pulso

se trata con adenosina y  
si no funciona se utiliza  
cardioversion

características del  
bloqueo tipo 1

características del  
bloqueo tipo 2

características bloqueo  
de segundo grado tipo 2

la frecuencia  
cardiaca esta  
por debajo de  
60 por minuo y  
el intervalo PQ  
se va alargado  
todos iguales

la frecuencia  
cardiaca esta por  
debajo de 60 por  
minuto y el  
intervalo PQ se  
va alargando  
hasta que no  
conduce uno

frecuencia cardiaca esta  
por debajo de 60 por min  
y un intervalo PQ normal  
y luego PQ que no  
conduce

**se tratan solo cuando el  
paciente tiene sintomas  
de bajo gasto**

Los síntomas de bajo  
gasto son

- Hipotensión
- Palidez
- Alteración del estado de conciencia

se tratan con atropina  
con una dosis de 3  
mg cada 3 a 5 min

si esto no funciona se  
trata con marcapasos