



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Martín Antonio Pérez Torres

Materia: patología del niño y el adolescente

Tema: manejo de paro cardiorespiratorio

Grado y grupo: " 5 a"

Nombre de la Profesora: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de febrero, 2025.

Manejo de paro cardiorrespiratorio

La reanimación cardiopulmonar básica (RCP) es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en Situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria.

- Verificar el nivel de consciencia del niño.** { Podemos preguntar cómo se encuentra o practicarle leves sacudidas o palmadas.
- Si obtenemos respuesta.** { Si el niño responde moviéndose o verbalmente, deberemos dejar al niño en la posición en la que lo hemos encontrado.
- Si no obtenemos respuesta.** { pedir ayuda. Si el niño está inconsciente debemos pedir ayuda a alguna persona cercana.
- Colocar al niño boca arriba.** { Debemos tumbar al niño sobre una superficie dura y plana
- Abrir las vías respiratorias.** { Maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca.
- Valorar y comprobar la respiración.** { Debemos poner el oído cerca de la nariz y boca del niño y observar el tórax para comprobar si respira.
- Si respira** { le colocaremos en posición lateral de seguridad (PLS).

Si el niño no respira. {
Abrir las vías aéreas.
Tapar la nariz del niño.
Inspirar profundamente.

Comprobar signos de vida { deberemos observar signos de tos, movimientos y/o respiración.

Realizar las compresiones torácicas. { El objetivo es comprimir el tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre salga del corazón y circule por el Cuerpo.

Llamar a urgencias y comprobar signos de vida { A los 2 minutos deberemos comprobar la eficacia de nuestras maniobras: aparición de signos de vida y/o respiración espontánea.

Finalizar la RCP { Deberemos continuar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones hasta que: LLEGUE LA AYUDA.



CONCLUSION.

El manejo efectivo de un paro respiratorio requiere de una intervención rápida y adecuada. La clave para salvar la vida es detección temprana y actuar inmediatamente. El uso de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) como la respiración artificial y la compresión torácica, pueden ayudar a restaurar la función respiratoria y cardiaca, además la administración de medicamentos como epinefrina, y la intubación traqueal puede ser necesaria para mantener la vía aérea permeable y garantizar la oxigenación adecuada.

Es importante recordar que no es recomendable realizar maniobras de reanimación con el lactante en brazos y en movimiento. Solo de forma excepcional, podemos movilizar al niño en caso de que nos desplazemos para solicitar ayuda y continuar las maniobras en el otro lugar.

BIBLIOGRAFIA.

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.2023 ANTOLOGIA DE PATOLOGIA
DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE.PDF**

**[Http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/304f
2ca5b8a22a4felbaf8d4c705718f.pdf.](http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/304f2ca5b8a22a4felbaf8d4c705718f.pdf)**