



## Cuadro Sinoptico

Nombre del alumno: Paulo Fernando Navarro Aguilar.

Materia: Patología del niño Y adolescente

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba.

Nombre del tema: Manejo de paro respiratorio.

Licenciatura: Lic. En enfermería.

Cuatrimestre: 5






MANEJO DE PARO RESPIRATORIO



La reanimación cardiopulmonar básica (RCP) es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado.

PASOS PARA EL RCP



VERIFICAR NIVEL DE CONCIENCIA



Podemos preguntar cómo se encuentra o practicarle leves sacudidas o palmadas

SI OBTENEMOS RESPUESTA



Si el niño responde moviéndose o verbalmente, deberemos dejar al niño en la posición en la que lo hemos encontrado

SI NO OBTENEMOS RESPUESTA



Si el niño está inconsciente, debemos pedir ayuda a alguna persona cercana

COLOCAR AL NIÑO BOCA ARRIBA



Debemos tumbarlo sobre una superficie dura y plana, con la cabeza boca arriba y las extremidades alineadas

ABRIR VIAS RESPIRATORIAS



Para la apertura de las vías respiratorias se realizará la maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca

VALORAR RESPIRACION



Debemos poner el oído cerca de la nariz y boca del niño y observar el tórax para comprobar si respira.

SI RESPIRA



Le colocaremos en posición lateral de seguridad (PLS) siempre que sea posible y llamaremos a urgencias

SI NO RESPIRA



no respira y estamos acompañados de otra persona, debemos indicarle que avise a emergencias (112). Mientras, nosotros no nos separaremos del niño e iniciaremos la respiración artificial (boca-boca).

COMPROBAR SIGNOS



Para comprobar los signos de vida deberemos observar signos de tos, movimientos y/o respiración.

REALIZAR COMPRESIONES



El objetivo es comprimir el tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre salga del corazón y circule por el cuerpo.

LLAMAR A URGENCIAS



Si al cabo de un minuto de empezar la RCP, seguimos solos y no hemos podido llamar a urgencias

FINALIZAR RCP



Deberemos continuar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones hasta que: - llegue la ayuda del profesional - la víctima recupere la respiración efectiva





## CONCLUSION

El RCP es un procedimiento de emergencia que se utiliza para restaurar la circulación sanguínea Y la respiración en una persona que ha sufrido un paro cardíaco.

En conclusión, el RCP es una técnica vital que puede salvar vidas en situaciones de emergencia, su aplicación oportuna Y correcta puede aumentar las posibilidades de supervivencia Y reducir el riesgo de daños cerebrales Y otros problemas de salud a largo plazo.