



nombre del alumno: Alicia lizeth Pérez Aguilar

nombre del tema: manejo de paro cardiorespiratorio

nombre de la materia: Enfermería clínica I

nombre del profesor: María del Carmen Lopez Silba

cuatrimestre: 5^o-

CONCEPTO

La reanimación cardiopulmonar básica (RCP) es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado.

LOS PASOS DE LA RCP

siguen una secuencia lógica para garantizar la efectividad y éxito de la técnica.

2 INSUFLACIONES RCP

EJEMPLOS

Hacer 5 insuflaciones de rescate (soplos) uniformes hasta comprobar el torax del niño se eleva.
retirar la boca para tomar aire y observar que el torax vuelva a bajar.
mientras se realizan las insuflaciones de rescate deberemos comprobar si provocan alguna respuesta en forma de movimientos respiraciones o tos.
consultar como funciona el naejo de la obstruccion de la via aerea por cuerpo extraño.



EJEMPLOS

- 1- verificar el nivel de conciencia del niño. Si obtenemos respuesta.
- 2- Si el niño responde moviéndose o verbalmente, deberemos dejar al niño en la posición en la que lo hemos encontrado.
- 3- Si no obtenemos respuesta, pedir ayuda. Colocar al niño boca arriba.
- 4- Debemos tumbar al niño sobre una superficie dura y plana, con la cabeza boca arriba y las extremidades alineadas.
- 5- Abrir las vías respiratorias. Para la abertura de las vías respiratorias se realizará la maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca.
- 6- Valorar y comprobar la respiración del niño, debemos poner el oído cerca de la nariz y boca del niño y observar el torax para comprobar si respira.
- 7- si respira le posicionaremos en posición lateral de seguridad.
- 8- si el niño no respira y estamos acompañados de otra persona, debemos indicarle que avise a emergencia (112).
- 9- comprobar signos de vida.
- 10- realizar las compresiones torácicas, el objetivo es comprimir el torax contra la espalda de forma rítmica.



Continuar la rcp 30 compresiones cardiacas, seguidas de 2 insuflaciones y respirar.
llamar a emergencia y comprobar los signos de vida.

A los dos minutos deberemos comprobar la eficacia de nuestras maniobras aparición de signos de vida. / respiración espontánea.

Finalizar la rcp. deberemos continuar combinando de 30 compresiones torácicas con ventilaciones hasta que: ayuda profesional, la víctima recupere la respiración efectiva y estemos exhaustos.

es importante recordar que no es recomendable realizar maniobras de reanimación con el lactante en brazos y en movimiento.



30



2

Despues de haber entedido el tema es importante saber como reaccionar correctamente ante estas situaciones por que podemos evitar la muerte en niños y adolocentes como adultos mayores evitar la muerte de una hipotetica victima, asi mismo estoy comvencido de que debemos llevar una vida sana para evitar estos problemas de salud, como tambien el personal de salud debe estar informado de cada paso e detalles para hacer una buen manejo de cardiorespiratorio, de llevar y estar al pediente en el momento que se requiera de ayuda, ya que como enfermero debe de llevar una buena tecnica y atencion a los pacientes y asi evitar una mala atencion hacia los demas, de llevar siempre en cuenta que se trata de vidas, seres humanos y ellos confian en tener una buena atencion.

bibliografia

ANTOLOGIA OFICIAL UDS 2024

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/3ff03ca47ec4537653b7c98e9c3ad7c9-LC-LEN401%20ENFERMERIA%20CLINICA%20I.pdf>