

**Nombre del Alumno: Ana Gabriela López
Gómez**

**Nombre del docente: Josué Alejandro
Roblero Días**

Nombre del trabajo: Etapas del embarazo

**Nombre de la materia: Patologías Gineco-
Obstetricia**

Grado: 5

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de abril del 2025.

PATOLOGIAS GINECO-OBSTETRICAS.

DIAGNOSTICO.

- Examen ginecológico.
- Estudios clínicos.
- Consulta con expertos.
- Evaluación de CA 125: un tes de sangre



SIGNOS Y SINTOMAS.

Puede variar de persona a persona, algunas personas experimentan síntomas como, dolor en el pecho o dificultad para respirar, dolor pélvico, fatiga, dolor en la parte baja de la espalda o en las piernas.



TRATAMIENTO.

- Antibióticos.
- Trimetoprim con sulfametoxazol, amoxicilina.
- Terapia de estrógeno vaginal.

DIAGNOSTICO.

- Uso de endoscopia para observar el interior de la vejiga.
- Cultivo de bacterias en las vías urinarias.

TRATAMIENTO.

Puede ser complejo debido a la combinación de diferentes enfoques, como medicamentos, cirugía, cambios en el estilo de vida y control de dolor.

ENDOMETRIOSIS.

Es una infección en la que las células similares donde en el revestimiento del endometrio del útero crecen fuera del útero afectando el tejido pélvico.

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS.

Es la presencia de bacterias en el tracto urinario, que normalmente es estéril, y que produce síntomas variables.



SIGNOS Y SINTOMAS.

Uno de ellos son: Dolor o ardor al orinar fiebre, cansancio o temblores. Urgencia frecuente de orina.

DIAGNOSTICO.

Evidencias de hiperandrogenismo, al testosterona por en cima de las normas del adulto. Se realiza una prueba de 17 hidroxiprogesterona.



SIGNOS Y SINTOMAS.

Se desconoce los signos del síndrome pero se pueden incluir lo siguientes:

- Periodo menstrual irregular.
- Inflamación de bajo grado.

SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO.

Es una infección hormonal que afecta a las mujeres, se caracteriza por la presencia de múltiples quistes en los ovarios, anovulación u oligoovulación.



ABORTOS ESPONTANEOS.

Es la pérdida de un embarazo antes de la semana 20, aproximadamente cada 10 a 20% de los embarazos puede ocurrir durante el primer mes o a los tres meses del embarazo.

TRATAMIENTO.

Se puede tratar de lo siguiente:

- Esperar que el tejido salga de forma natural.
- Administrar pastillas.
- Extirpar el tejido durante una operación.

SIGNOS Y SINTOMAS.

Se incluye lo siguientes:

- San grado vaginal.
- Dolor abdominal.
- Presencia de coágulos.
- Latidos rápidos del corazón.



DIAGNOSTICO.

Para el diagnóstico, se debe realizar una ecografía ginecológica, las pruebas diagnósticas.

PATOLOGIAS GINECO-OBSTETRICAS.

DIAGNOSTICO.

- Examen del área pélvica.
- Prueba de laboratorio de muestras de células del cuello uterino o de la vagina.

SIGNOS Y SINTOMAS.

- Dolor contante y de intensidad leve.
- Dolor continuo o intermitente.
- Fiebre, a veces con escalofríos.
- Sangrado inusual de la vagina.
- Flujo de la vagina inusual o abundante.

TRATAMIENTO.

- Anticonceptivos hormonales.
- Terapia con progestina.
- Analgésicos, tratamientos hormonales.
- Laparoscopia, laparotomía o histerectomía.

DIAGNOSTICO.

El diagnóstico de la endometriosis es bastante complicado conocerlo pero sin embargo la primer alerta es el dolor pélvico.

TRATAMIENTO.

- El tratamiento puede ser :
 - Tratamiento hormonal.
 - Analgésicos musculares, y antipertensivos.
 - Terapia psicológica.

DOLOR PÉLVICO.

Es un malestar que se produce en la parte inferior del abdomen y la pelvis.

ENDOMETRIOSIS.

La endometriosis es una afección, muy dolorosa donde el tejido recubre el interior del útero, lo cual afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

SIGNOS Y SINTOMAS.

- Dolor pélvico.
- Calambres menstruales dolorosos.
- Menstruación voluminosa.
- Problemas de fertilidad.
- Quistes.

MIOMAS.

Es un Tumor Benigno, cancerígeno, de tamaño variable que se desarrolla en la pared muscular del útero. Aunque es posible que sólo se desarrolle un Mioma, en la mayoría de los casos hay más de uno.

TRATAMIENTO.


Se tiene como tratamiento los anticonceptivos orales, anti inflamatorios, En casos graves se requiere de una extirpación del mioma por medio de una cirugía las cuales serian: histeroscopia, embolización, miomectomía, histerectomía.

SIGNOS Y SINTOMAS.

En general este tipo de tumores no padecen ningún síntoma, suele detectarse cuando se realizan las revisiones médicas necesarias. Aunque en algunos casos aparecen síntomas, como sangrado menstrual abundante y duradero de lo normal.


DIAGNOSTICO.

- Exploración clínica.
- Ecografía ginecológica.
- Biopsia de endometrio.
- Histeroscopia.



DIAGNOSTICO.

Se diagnostica mediante una prueba de Papanicolaou, donde se extraen células del cuello uterino y las examina con un microscopio para identificar cualquier anomalía.




TRATAMIENTO.

1. Ablación mediante láser o electrocirugía.
2. Cirugía para congelar las células anormales.
3. Criocirugía, terapia con láser o medicamentos locales.

SIGNOS Y SINTOMAS.

En lo general no causa ningún síntoma, en las personas que desarrollan el VPH, cuando la enfermedad ya está muy avanzada puede causar sangrado y secreción atípicas.



DISPLASIA CERVICAL.

Es el crecimiento precanceroso de las células que se desarrollan en la superficie del cuello uterino, lo cual es una infección persistente del virus del papiloma humano.

TRATAMIENTO.

- Antidepresivos.
- Fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE).
- Diuréticos.
- Anticonceptivos hormonales.



DIAGNOSTICO.

No existen manifestaciones físicas únicas ni análisis de laboratorio para diagnosticar positivamente el síndrome premenstrual.

SINDROME PREMENSTRUAL.

Son síntomas físicos y emocionales que comienzan una o 2 semanas antes del periodo menstrual, donde la mayoría de las mujeres presenta al menos algunos síntomas los cuales desaparecen después de comenzar la menstruación.



SIGNOS Y SINTOMAS.

- Estado de ánimo.
- Cambios de humor.
- Cambios en el apetito.
- Problemas de sueño.
- Dolor de cabeza.
- Sensibilidad en los senos.
- Brotes de acné.

PATOLOGIAS GINECO-OBSTETRICAS.

SIGNOS Y SINTOMAS.

- Dolor en la región inferior del abdomen.
- Náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, dolor de cabeza o mareo.
- Dolor en la zona lumbar.
- Dolor en la cadera.



DISMENORREA PRIMARIA.

Ocurre cuando una mujer presenta dolor durante la menstruación en la parte baja del abdomen, en algunos casos también existe dolor de espalda.



DIAGNOSTICO.

En ello se realiza mediante anamnesis, que es un examen ginecológico, donde se realizan estudios complementarios, ultrasonido transvaginal o pélvico, resonancia magnética, histeroscopia o laparoscopia, debido a lo que el médico recomiende.



TRATAMIENTO.

Conforme a la gravedad se puede recomendar lo siguiente, ejercicio, dieta equilibrada; farmacológicas, antiinflamatorios, anticonceptivos hormonales y agentes antiespasmódicos, y, en casos específicos, procedimientos quirúrgicos.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/mioma/>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/endometriosis/symptoms-causes/syc-20354656>

<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/salud-y-bienestar/endometriosis>

<https://www.reproduccionasistida.org/diagnostico-endometriosis/#:~:text=Frecuentemente,%20el%20EE%80%80diagn%C3%B3stico%EE%80%81%20de%20la%20EE%80%80endometriosis%EE%80%81>

<https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/patologias-ginecologicas/>