



NOMBRE DEL ALUMNO

KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL PROFESOR

JOSUE ALEJANDRO

MATERIA

GINECOLOGIA OBSTETRICIA

TEMA

PATOLOGIAS GINECO-OBSTETRICAS

CUATRIMESTRES Y GRUPO

5-A

FEVHA DE ENTREGA

11/04/202

TRATAMIENTO


El tratamiento debe ser indicado por un médico, la paciente no debe quedarse en casa a esperar que el cuadro clínico desaparezca solo ya que podría ser letal. El objetivo del tratamiento es evitar el shock hemorrágico, la sepsis o el shock séptico.



SIGNOS Y SINTOMAS

En ocasiones, la adenomiosis no causa signos ni síntomas, o causa solo una molestia leve. Sin embargo, la adenomiosis puede causar lo siguiente:

- Sangrado menstrual abundante y prolongado
- Cólicos intensos o dolor pélvico punzante como una puñalada durante la menstruación (dismenorrea)
- Dolor pélvico crónico
- Relaciones sexuales dolorosas (dispareunia)



DIAGNOSTICO

Se realiza mediante un examen pélvico, ecografía transvaginal, resonancia magnética pélvica, y análisis microscópico del útero.

SIGNOS Y SINTOMAS

- Sangrado vaginal con o sin dolor, como un sangrado leve que se conoce como manchado.
- Dolor o calambres en la zona pélvica o en la parte baja de la espalda.
- Líquido o tejido que sale de la vagina.
- Latidos rápidos del corazón.

ABORTO ESPONTANEO

Es la expulsión de un embrión o feto de manera espontánea, es decir, sin ser provocado por ningún tipo de procedimiento realizado por médicos u otras personas. Se distingue pues del aborto inducido. El término solo se aplica estrictamente cuando la pérdida se produce hasta la semana 20 del embarazo.

PATOLOGIAS

ADENOMIOSIS

Afección caracterizada por la presencia y el crecimiento de tejido endometrial en la pared del útero. La adenomiosis suele aparecer en los últimos años de fertilidad y generalmente desaparece con la menopausia.

DIAGNOSTICO

Se realiza mediante una ecografía transvaginal, un examen pélvico y la medición de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (beta-hCG).

EMBARAZO ECTOPICO

Embarazo en el que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero. El óvulo fertilizado no puede sobrevivir fuera del útero. Si se permite que siga creciendo, puede dañar los órganos cercanos y ocasionar una pérdida de sangre mortal.



SIGNOS Y SINTOMAS

Los síntomas de embarazo ectópico pueden incluir:

- Sangrado vaginal anormal
- Cólico leve en un lado de la pelvis
- Ausencia de periodos
- Dolor en la parte inferior del abdomen o en la zona de la pelvis

DIAGNOSTICO

Un examen pélvico puede ayudar a tu médico a identificar áreas de dolor, sensibilidad o un bulto en una trompa de Falopio o en un ovario. Sin embargo, tu médico no puede diagnosticar un embarazo ectópico al examinarte. Necesitarás análisis de sangre y una ecografía.

TRATAMIENTO

El embarazo ectópico puede ser potencialmente mortal. El embarazo no puede continuar hasta el nacimiento (a término). El tratamiento eficaz requiere tratamiento médico para interrumpir el embarazo o extirpación quirúrgica del embarazo.

TRATAMIENTO

Algunos fármacos pueden aliviar el dolor o disminuir el sangrado intenso. La única cura consiste en extirpar el útero (histerectomía).

TRATAMIENTO

1. Para la vaginosis bacteriana, se recomienda el uso vaginal de clindamicina o metronidazol en gel o crema. 2. En caso de candidiasis o infección fúngica, se debe administrar clotrimazol vía vaginal. 3. Para la vaginitis tricomoniasis, se debe ingerir metronidazol por vía oral.

DIAGNOSTICO

-Revisar tus antecedentes médicos, incluyendo tus antecedentes de infecciones vaginales o infecciones de transmisión sexual.
-Realizar un examen pélvico para buscar signos de infección.
-Recolectar una muestra de flujo vaginal para hacer un análisis de laboratorio.
-Hacer una prueba de pH vaginal.
-Preguntar sobre los síntomas, la frecuencia de las infecciones anteriores y los factores de riesgo, como el uso de antibióticos o el embarazo.
-Los síntomas de la vaginosis bacteriana incluyen secreción vaginal ligera que puede ser gris, blanca o verde, olor vaginal fétido, picazón vaginal y ardor al orinar.

TRATAMIENTO

-Transfusión intrauterina
-ecografías
-parto adelantado
Otros tratamientos
-Tomar una vitamina prenatal que contenga hierro En algunos casos, el proveedor de atención

SIGNOS Y SINTOMAS

-Dolor o ardor al orinar
-Dolor durante las relaciones sexuales
-Prurito en la región íntima
-Descarga con o sin mal olor
-Heridas, úlceras o verrugas en la región íntima

INFECCIONES VAGINALES

Las infecciones vaginales, son aquellas que afectan la parte externa del aparato reproductor femenino, la vagina, que es el conducto que da entrada al útero.



PATOLOGIAS

ANEMIA FETAL

causa importante de morbilidad fetal y neonatal. Puede pasar desapercibida al examen ecográfico si es leve o moderada, a menos que existan criterios de sospecha por los antecedentes maternos (factor Rh negativo, hemoglobinopatías).

DIAGNOSTICO


Es la medición de la Hb fetal mediante cordocentesis percutánea, el pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media (PVS - ACM) parece ser la mejor de las pruebas para el diagnóstico no invasivo de anemia fetal.

PREECLAMPSIA

Es la presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 de embarazo. Si bien es poco frecuente, la preeclampsia también se puede presentar en una mujer después de dar a luz a su bebé, casi siempre dentro de las siguientes 48 horas. Esto se denomina preeclampsia posparto.

SIGNOS Y SINTOMAS

Hinchazón de manos y cara o en las áreas alrededor de los ojos (edema periorbitario)
-Aumento repentino de peso en un período de 1 a 2 días, o más de 2 libras (0.9 kg) por semana
-Dolores de cabeza que no desaparecen o empeoran.
-Problemas para respirar.
-Sentirse mareada y desmayarse.



TRATAMIENTO

-Control prenatal
-Reposo y medicamento
-Anticonvulsiones
-Hospitalización
-parto

DIAGNOSTICO

Se diagnostica preeclampsia si tienes presión arterial alta después de 20 semanas de embarazo y al menos uno de los siguientes síntomas:
-Proteína en la orina (proteinuria), que indica deficiencia renal
-Otros signos de problemas renales
-Bajo recuento de plaquetas

SIGNOS Y SINTOMAS

Palidez en la piel y mucosas.
-Cansancio excesivo sin causa aparente.
-Sueño.
-Sudoración.
-Dolor de cabeza.
-Apatía.
-Fatiga y debilidad
-Mareos y desmayos
-Latidos cardíacos irregulares.
-Piel pálida o amarillenta.
-Manos frías y pies.

ANEMIA FETAL

- Signos
- Polihidramnios
- Derrame pericardico
- Hepatomegalia
- Ascitis
- Edema



TRATAMIENTO

El tratamiento médico suele ser la primera línea de manejo, especialmente para los miomas más pequeños o cuando los síntomas son leves a moderados. Los objetivos del tratamiento médico son aliviar los síntomas y, en algunos casos, reducir el tamaño de los miomas. Entre las opciones de tratamiento médico se incluyen:

- Medicamentos Antihormonales
- Tratamientos sintomáticos no hormonales
- Tratamientos sintomáticos hormonales

SIGNOS Y SINTOMAS

Cuando el mioma causa síntomas, estos normalmente se encuadran en una de las tres categorías:

- Sangramiento vaginal.
- Dolor pélvico.
- Problemas reproductivos.


TRATAMIENTO

El tratamiento de la diabetes gestacional incluye:

- Cambios en el estilo de vida
- Control de la glucosa sanguínea
- Medicamentos, si es necesario
- Dieta y ejercicio
- Insulina, en algunos casos
- Asesoramiento dietético el objetivo del tratamiento es la regulación del metabolismo materno y el desarrollo normal del embarazo y del parto.

DIAGNOSTICO

mediante análisis de sangre que evalúan la glucosa en la sangre. Se pueden realizar pruebas de sobrecarga oral de glucosa o pruebas de tolerancia oral a la glucosa.




DIAGNOSTICO

El diagnostico de miomas uterinos se puede realizar mediante:

- Exploración clínica para conocer el tamaño y la forma del útero.
- Ecografía ginecológica para conocer el tamaño.
- histeroscopia.
- Biopsia de endometrio

MIOMAS UTERINOS

es un tumor originado en el tejido muscular del útero. Son tumores benignos del útero, es decir, lesiones que no son cáncer y no tienen ningún riesgo de transformación maligna.



DIABETES GESTACIONAL

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes leve que se desarrolla en algunas mujeres durante la última etapa del embarazo.


SIGNOS Y SINTOMAS

- Visión borrosa.
- Fatiga.
- Mucha sed.
- Ganas frecuentes de orinar.
- Náuseas y vómitos.

PATOLOGIAS

SIGNOS Y SINTOMAS

La displasia cervical generalmente no presenta síntomas específicos que permitan realizar un diagnóstico clínico, por lo que es importante un chequeo ginecológico periódico.




DISPLASIA CERVICAL

es una afección que afecta a miles de mujeres cada año y que, si no se detecta a tiempo, puede evolucionar en cáncer de cuello uterino. Se trata de una alteración anormal en las células del cuello uterino, generalmente causada por una infección persistente con el virus del papiloma humano (VPH).

CANCER CUELLO UTERINO

es cáncer que se origina en las células del cuello del útero. También se conoce como cáncer de cérvix o cáncer cervicouterino. El cuello uterino es la porción final, inferior y estrecha del útero (matriz) que conecta el útero con la vagina (canal del parto).



TRATAMIENTO

Dependiendo del grado de displasia, se puede indicar lo siguiente:

- Criocirugía para congelar las células anormales
- Fotovaporización de cérvix con láser, es decir uso del haz de luz del láser para tratar células anormales del cérvix
- Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP), el cual utiliza electricidad para eliminar tejido anormal.
- Cirugía para extirpar el tejido anormal (conización quirúrgica)
- Histerectomía en raras ocasiones

DIAGNOSTICO

se realiza con un examen pélvico, una citología vaginal, una prueba de VPH, una colposcopia y una biopsia.

SIGNOS Y SINTOMAS

- Dificultad o dolor al evacuar, o sangrado del recto con las evacuaciones intestinales.
- Dificultad o dolor al orinar, o sangre en la orina.
- Dolor sordo en la espalda.
- Hinchazón de las piernas.
- Dolor en el abdomen.
- Sensación de cansancio.

TRATAMIENTO

El tratamiento contra el cáncer podría incluir:

- Cirugía.
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Inmunoterapia
- Terapia dirigida

DIAGNOSTICO

mediante una prueba de Papanicolaou (Pap), una prueba del virus del papiloma humano (VPH) o una prueba conjunta de ambas. Estas pruebas se realizan durante un examen pélvico.

[Aborto espontáneo - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)

[Mioma uterino \(fibroma\): qué es, síntomas y tratamiento](#)

[Displasia cervical: causas, síntomas y tratamiento - Infobae](#)

[Displasia cervical: Síntomas, causas y tratamiento](#)

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cervical-cancer/diagnosis-treatment/drc-20352506#:~:text=Con%20la%20prueba%20de%20Papanicolaou,del%20virus%20del%20papiloma%20humano>

[¿Qué es la diabetes gestacional? - Causas, síntomas y tratamiento](#)

[Diabetes gestacional - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic](#)

[Preeclampsia - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic](#)