



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Erandy Natali Alfaro Hernández

Nombre del tema: Cuadro sinóptico

Parcial:

Nombre de la Materia: Fisiopatología II

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez, Chiapas 12 de Febrero de 2025

PROTOCOLO DE INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADO

CONCEPTO

es un cuadro clínico producido por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa y la acumulación de acetilcolina

MEDIOS DE INTOXICACION

- contacto cutáneo
- inhalación
- entrada vía digestiva
- por causa laboral
- accidental o voluntaria



CUADRO CLINICO

El cuadro clínico comienza entre 30 minutos y 2 horas tras el contacto, dependiendo de la vía de entrada, la dosis, el tipo de organofosforado y la susceptibilidad individual.

SINTOMAS

- Nivel digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, sialorrea
- Respiratorio: tos, disnea, broncoespasmo, insuficiencia respiratoria, neurológica cefalea, mareo, miosis, convulsiones, coma
- cardiovascular: taquicardia, bradicardia, hipotensión arterial), musculares fasciculaciones y cutánea sudoración, cianosis,
- Muerte

CRITERIOS DE GRAVEDAD

- Grado 0: no intoxicación
- Grado 1: intoxicación leve: síntomas irritativos y/o síndrome muscarínico incompleto.
- Grado 2: intoxicación moderada: síntomas muscarínicos y nicotínicos.
- Grado 3: intoxicación severa: asocian compromiso cardiovascular, respiratorio y/o del SNC, requiriendo soporte de funciones vitales. Grado 4: muerte. un entorno seguro al paciente