

UDS

ALUMNA: Estrella Guadalupe Loya Gordillo.

PROFESOR Felipe Antonio Morales Hernandez.

MATERIA: ginecologia y obtetricia

TRABAJO: mapa conceptual



Dolor de cabeza



Fatiga



Náuseas y vómitos



Hipertensión



Sangrado nasal



Visión borrosa

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

PREECLAMPSIA

La Preeclampsia se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del embarazo. Se suele acompañar de edemas pero no es necesaria la presencia de éstos para ser diagnosticada. Es una enfermedad característica y propia del embarazo de la que se pueden tratar los síntomas, pero sólo se cura con la finalización del mismo y si no se trata adecuadamente puede ser causa de graves complicaciones tanto para la mujer embarazada como para el feto.

ECLAMPSIA

Se denominan así las convulsiones similares a una crisis epiléptica aparecidas en el contexto de una preeclampsia e hiperreflexia. Suponen un riesgo vital y pueden ocurrir antes, durante o después del parto.



SINDROME DE HELLP

hemólisis (HE) elevación de los enzimas hepáticos (EL), y bajo recuento de plaquetas (LP). Es un síndrome grave de comienzo insidioso, en el que pueden confluir diversas etiologías, pero que lo más habitual es que aparezca una preeclampsia, aunque a veces no sea manifiesta aún en el momento de su aparición, y que suele acompañarse de dolor en epigastrio y/o hipocondrio derecho y malestar general. Ello causa que a veces se retrase su diagnóstico pensando en una hepatitis, virusis, o una gastroenteritis

Preeclampsia

Factores de riesgo:



SÍNDROME DE HELLP

