



Mi Universidad

Ensayo

<i>Nombre del Alumno</i>	<i>Pilar del Roció González Aguilar</i>
<i>Nombre del tema</i>	<i>tríptico</i>
<i>Parcial</i>	<i>2</i>
<i>Nombre de la Materia</i>	<i>calidad en los servicios de enfermería</i>
<i>Nombre del profesor</i>	<i>maría José Hernández</i>
<i>Nombre de la Licenciatura</i>	<i>Enfermería general</i>
<i>Cuatrimestre</i>	<i>8</i>

¿EN QUÉ CONSISTE?

es un tubo que se inserta en la nariz y que llega al estómago. La sonda permite administrar leche materna, fórmula o alimentos en líquido directamente al estómago, para que el niño reciba calorías adicionales. Este método de alimentación ayuda a que el niño reciba la nutrición que necesita para crecer, desarrollarse, recuperarse de enfermedades, jugar y aprender.



¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE DEBE LLAMAR AL MÉDICO?



LLAME SI EL NIÑO:

- tiene fiebre
- tiene vómito o diarrea que no se van.
- está irritable o es difícil de consolar.
- tiene dolor o distensión anormal en el abdomen.
- si usted tiene preguntas acerca del uso de la sonda.
- tiene dificultad para respirar: llame al número para emergencias 911.



VIGILANCIA Y CONTROL AL NEONATO CON ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGASTRICA





VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LA SONDA

Observar que la marca de la sonda esté alineada con la fosa nasal
Medir la sonda desde la marca hasta el tubo
Verificar la ubicación con una tira de pH

OBSERVAR AL NIÑO

Verificar que el niño esté cómodo y respire normalmente
Verificar que no tenga náuseas, tos, vómito, dolor abdominal, o que no le salga la sonda por la boca

CUIDADO DE LA PIEL

- Límpiele la piel alrededor de la sonda con agua tibia frecuentemente y quite las secreciones. Si la fosa nasal se enrojece o la piel se irrita, retire la sonda e inserte una nueva en la otra fosa, de ser posible.

Si ha usado un vendaje transparente en la cara del niño, despéguelo poco a poco con aceite mineral. Si utiliza las toallitas especiales para desactivar el adhesivo, limpie la piel con agua para quitar todo el residuo, pues puede ser muy irritante.



OTROS CUIDADOS

Realizar balance hídrico y verificar diariamente la eliminación intestinal
Vigilar signos y síntomas de déficit de electrolitos
Verificar que se está administrando nutrición para diabéticos

ADMINISTRAR LA ALIMENTACIÓN

- Mantener abierto el tapón de la sonda con una pinza para que no entre aire
- Administrar el alimento en el tiempo previsto
- Si se van a administrar medicamentos, estos deben estar completamente triturados y deshacerse con agua
- Vigilar signos de infección, controlar la temperatura
- Verificar la posición de la sonda, velocidad de infusión e intolerancia a los ingredientes de la fórmula para alimentación

