



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesora: MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ

Materia: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA

Tema: VIGILANCIA DE CONTROL DEL NEONATO CON RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA

CUATRIMESTRE 8

GRUPO C

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

HIPERBILIRRUBINEMIA

Es un exceso de bilirrubina en la sangre del bebé. La ictericia fisiológica es la causa más común y suele ser benigna. Sin embargo puede ser indicador de una enfermedad grave.

FACTORES DE RIESGO

Prematurez, baja de peso excesiva, Incompatibilidad de grupo clásico, sexo masculino, lactancia materna.

SIGNOS DE ALARMA:

* Ictericia en el primer día de vida

* Bilirrubina total sérica $>18\text{mg/dL}$

* Tasa de aumento de bilirrubina sérica total $>0,2\text{ mg/dL/h}$



VIGILANCIA Y CONTROL DEL NEONATO CON RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA



CRISOLITO GARCÍA HERNÁNDEZ
8 CUATRIMESTRE GRUPO C
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

PROFESORA:
MARIA JOSE HERNÁNDEZ

TRANSCRIPCIÓN

***El RN se encuentra desnudo con exposición de toda su piel a la luz**

Mantiene la lámpara de fototerapia a una altura de 45 a 55 cm. del neonato

***Protección ocular (antifaz)**

***vigilancia de signos vitales**

***Control térmico**

***vigilancia estrecha del estado de hidratación (piel y mucosas)**

vigilancia de la tolerancia de la vía oral

Frecuencia y características de la orina y evacuaciones

vigilancia del estado neurológico (disminución o ausencia de reflejos primarios: Babinsky, moro, búsqueda, succión, presión).

VALORAY REGISTRA LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE RIESGO PAR HIPERBILIRRUBINEMIA



1. Valora y registra factores de riesgo del neonato para presentar hiperbilirrubinemia
2. Valora los signos y síntomas de riesgo para hiperbilirrubinemia en el neonato
3. valorar y registrar resultados del laboratorio
4. Establece un plan de cuidados y ejecuta intervenciones de enfermería
5. Establece el plan de alta del neonato de riesgo

ESTABLECE PLAN DE CUIDADOS Y EJECUTA INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA



Revise en la hoja de registros clínicos de enfermería, que estén anotados por los menos siete signos y síntomas de riesgo para la hiperbilirrubinemia en el neonato, como son:

constate por observación y en los registros de enfermería que por lo menos existan siete de las siguientes intervenciones de enfermería que se están realizando o sean correspondientes al manejo del RN con hiperbilirrubinemia:

- * Icteria cefalo cudad
- * palidez de piel y mucosas
- *Hepatoesplenomegalia
- *Anemia
- *Hipoactividad
- *Succión débil
- *Intolerancia a la vía oral
- * Llanto neurológico
- *Fiebre
- *Ausencia de reflejos primarios Babinsky, moro búsqueda, succión, presión.