



Nombre del Alumno. Floricelda Cruz Calvo

Nombre del tema: Prevención De UPP En Pacientes Hospitalizados

Nombre de la Materia: Calidad En Los Servicios De Enfermería


Nombre del profeso: María José Hernández Méndez

Nombre de la Licenciatura. Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: Octavo Semestre

ULCERAS POR PRESION

Son lesiones que se producen en la piel y en los tejidos que están por debajo de ella, provocadas por la presión de una superficie dura que está en contacto con una parte del cuerpo. popularmente se las conoce como (llagas) y aparecen cuando una persona está en la misma postura sobre una superficie dura durante largos periodos de tiempo.



FACTORES DE RIESGO

hay dos factores principales que influyen en aparición de una UPP: la presión y el tiempo

¿POR QUE PARECEN?

por la presión que soporta una zona del cuerpo (generalmente una prominencia ósea) de manera constante durante mucho tiempo, lo cual produce la disminución del riego sanguíneo y del aporte de oxígeno a los tejidos.

Vigilancia estricta en pacientes de alto riesgo: exploración física dirigida y palpación de zonas susceptibles, realizada inmediatamente por el médico o por personal de enfermera.



Importancia de los cambios de posición en paciente encamado

iiTratar una úlcera por presión es mucho más difícil que prevenirla!!



iiLa prevención es la máxima prioridad!!

UNIVERSIDAD DEL
SURETE (UDS)

PREVENCION DE UPP EN PACIENTES HOSPITALIZADOS



Alumno: Floricelda Cruz Calvo

Docente: María José Hernández
Méndez

Octavo Cuatrimestre

"Enfermería"

FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO Y AUMENTA LA VULNERABILIDAD DE LA PIEL

- La humedad (orina, heces, sudor y exudados) irrita la piel
- La malnutrición y la escasa ingesta de líquidos debilitan los tejidos
- Las enfermedades de los sistemas circulatorio y respiratorio disminuyen la oxigenación en los tejidos
- La edad avanzada.

ZONAS FRECUENTES



Lo más frecuente es que aparezcan en las zonas de prominencias Oseas, como las caderas, los talones, la espalda y la parte inferior de la espalda.



¿QUE HACER EN CASO DE QUE APAREZCAN UPP?

Si detecta enrojecimiento de la piel, una zona azulada o una ampolla, informe inmediatamente al personal médico o de enfermería. Si esto ocurre, se deben reforzar las medidas de prevención, ya que hay riesgo de que aparezcan más úlceras.



El personal de enfermería diseñará un plan de cuidados para el control y el seguimiento de la úlcera, y le informará de todos los aspectos que debe observar:

- mal olor de la úlcera
- dolor en la zona ulcerada
- líquido que sale del apósito
- zona alrededor de la úlcera enrojecida o caliente



PREVENCION

- Cambio de posición cada 2 horas
- Levantar diariamente al paciente



- Higiene de la piel
- Hidratación, lubricación y masaje circular de la piel
- Evaluar la tolerancia de tejido a la presión



- Uso de equipos de dispersión de presión: colchón de presión alterna, almohadones, férulas de espuma.

