



Arreola González Jesús Reveriano

Barreda Roberto Garcia Sedano

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Introducción a la cirugía Patología Y técnicas quirúrgicas Equinos

Tapachula, Chiapas

08 de Marzo del 2025

Etiología

Es causada por el virus homónimo, que pertenece al grupo de los arbovirus.



Transmisión

se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. El virus se multiplica en los mosquitos.

- Cómo se transmite
- El virus se transmite entre roedores selváticos y mosquitos.
 - Los caballos pueden actuar como amplificadores de la infección durante las epidemias

Signos

incluyen fiebre de moderada a alta, anorexia, depresión, falta de apetito, déficit en la actividad de los nervios craneales.

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

Mortalidad

- En un brote en Colombia, la tasa de letalidad estimada fue de 0,7%.
- En los equinos, la EEV es principalmente mortal.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico para la encefalitis equina venezolana (EEV). Las medidas de atención primaria incluyen: Reposo absoluto, Hidratación adecuada.

Control

se realiza mediante medidas de vigilancia, vacunación y fumigaciones.

Perio de incubación

Es de 5 a 14 días. Los primeros síntomas pueden aparecer entre 1 y 5 días después de la infección.

