



UNIVERSIDAD
DEL SURESTE



SUPER NOTA

**MATERIA: INTRODUCCION
A LA CIRUGIA, PATOLOGIA
Y TECNICAS QUIRURGICAS
DE EQUINOS**

NOMBRE DEL DOCENTE:
BARREDA ROBERTO GARCIA
SEDANO

NOMBRE DEL ALUMNO:
HECTOR ANTONIO FLORES
SANCHEZ

28 DE MARZO DE
MARZO DEL 2025

CÓLICO EN EQUINOS

¿Qué es el Cólico?

El término "cólico" se utiliza en medicina equina para denominar un síndrome caracterizado fundamentalmente por dolor abdominal agudo.



El cólico equino causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales. Es una urgencia que si no es atendida, puede causar la muerte.



DEFINICIÓN

El cólico en equinos es un síndrome caracterizado por dolor abdominal de diversas etiologías. Es una de las principales causas de emergencia veterinaria en caballos y puede variar desde cuadros leves hasta afecciones que requieren intervenciones quirúrgicas.

TIPOS DE CÓLICO

Espasmódico: causado por hiperperistaltismo intestinal debido a cambios en la dieta, estrés o infestaciones parasitarias.

Impaccional: resultado de la acumulación de material alimenticio seco o arena en el intestino, frecuentemente en el colon.

Gaseoso: producido por fermentación excesiva y acumulación de gas en el intestino grueso o ciego.

Torsiones o desplazamientos: involucran una alteración anatómica del intestino que puede comprometer el flujo sanguíneo y llevar a necrosis

SIGNOS CLÍNICOS

- Inquietud, patea el suelo o se revuelca.
- Sudoración excesiva.
- Posturas anormales (mirarse el flanco, estirarse como un perro "rezando").
- Disminución o ausencia de ruidos intestinales.
- Aumento de la frecuencia cardíaca (>60 lpm en casos graves).



SINAIS DE CÓLICA



ESCAVAR



SUOR EXCESSIVO



POSIÇÃO CAVALETE



COICES EM DIREÇÃO AO ABDÔMEN



ROLAR EM EXCESSO



SEM APETITE



DIAGNÓSTICO

- Exploración física completa.
- Auscultación abdominal.
- Evaluación de mucosas y signos vitales.
- Palpación rectal.
- Sondaje nasogástrico para evaluar presencia de reflujo.



TRATAMIENTO (TX)

- Manejo médico (para casos leves a moderados).
- Analgésicos y antiespasmódicos (flunixin meglumina, butilioscina).
- Fluidoterapia intravenosa para corregir deshidratación y balance electrolítico.
- Sondaje nasogástrico para aliviar presión y administrar lubricantes (aceite mineral).
- Laxantes y enemas en casos de impactación.

PREVENCIÓN Y CONTROL

- Dieta equilibrada con acceso constante a agua limpia.
- Alimentación con forraje de calidad y evitando cambios bruscos en la dieta.
- Desparasitación regular según plan veterinario.
- Ejercicio diario adecuado.
- Evitar ingestión de arena utilizando comederos elevados o agregando psilio en la dieta.

INFOGRAFIA

[HTTPS://CABALLODOMESTICO.COM/TIPOS-DE-COLICO-EQUINO/](https://cabalلودomestico.com/Tipos-de-Colico-Equino/)

[HTTPS://HEALTHFARMVET.COM/ENFERMEDADES-CABALLOS/COLICO-EN-CABALLO/](https://healthfarmvet.com/enfermedades-caballos/colico-en-caballo/)

[HTTPS://WWW.ACVS.ORG/ES/LARGE-ANIMAL/COLIC-IN-HORSES/](https://www.acvs.org/es/Large-Animal/Colic-in-Horses/)