



SUPER NOTA DE COLICOS EN EQUINOS

HERNANDEZ SOLORIO JOSE JULIAN

M.V. Z BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
EQUINOS.

Tapachula, Chiapas 29 de marzo del 2025

COLICOS EN EQUINOS

QUE ES?



SON UNA DE LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS VETERINARIAS SON UNA DE LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS VETERINARIAS EN CABALLOS Y PUEDEN VARIAR EN GRAVEDAD, DESDE MOLESTIAS LEVES HASTA CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DEL ANIMAL. EL TÉRMINO "CÓLICO" SE REFIERE A UN SÍNDROME DE DOLOR ABDOMINAL. CAUSADO POR DIVERSOS CAUSADO POR DIVERSOS FACTORES, COMO PROBLEMAS DIGESTIVOS, TORSIONES INTESTINALES O ACUMULACIÓN DE GASES.

CAUSAS

- CÓLICOS ESPASMÓDICOS : SE DEBEN A CONTRACCIONES EXCESIVAS DEL INTESTINO, CAUSADAS POR CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN, ESTRÉS O PARÁSITOS.
- CÓLICOS POR IMPACTACIÓN : BLOQUEO DEL INTESTINO POR ACUMULACIÓN DE ALIMENTO SECO, ARENA O CUERPOS EXTRAÑOS.
- CÓLICOS GASEOSOS : ACUMULACIÓN EXCESIVA DE GAS EN EL INTESTINO DEBIDO A FERMENTACIÓN ANORMAL DE LOS ALIMENTOS.
- TORSIÓN INTESTINAL : UNA DE LAS FORMAS MÁS GRAVES, OCURRE CUANDO UNA PARTE DEL INTESTINO SE RETUERCE SOBRE SÍ MISMA, CORTANDO EL FLUJO SANGUÍNEO.



SINTOMAS

LOS SIGNOS CLÍNICOS VARÍAN SEGÚN LA CAUSA Y LA GRAVEDAD DEL CÓLICO, PERO PUEDEN INCLUIR:

- ✓ INQUIETUD, ANSIEDAD O SUDORACIÓN EXCESIVA.
- ✓ MIRARSE, MORDERSE O PATEARSE EL ABDOMEN.
- ✓ RASCAR EL SUELO, ACOSTARSE Y RODAR REPETIDAMENTE.
- ✓ DISMINUCIÓN O AUSENCIA DE RUIDOS INTESTINALES.
- ✓ FALTA DE APETITO Y DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL.
- ✓ DISTENSIÓN ABDOMINAL (HINCHAZÓN).
- ✓ AUMENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA.
- ✓ ENCÍAS PÁLIDAS O CONGESTIONADAS, SIGNOS DE CHOQUE.



TRATAMIENTO

- RATAMIENTO MÉDICO (PARA CASOS LEVES A MODERADOS):
- ANALGÉSICOS Y ANTIESPASMÓDICOS (EJ: FLUNIXINA MEGLUMINA, BUTORFANOL).
- FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA PARA REHIDRATAR.
- ADMINISTRACIÓN DE ACEITE MINERAL O LAXANTES PARA IMPACTACIONES.
- ANTIBIÓTICOS SI HAY INFECCIÓN.
- CONTROL DE LA DIETA Y REPOSO.
- TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (PARA CASOS GRAVES):
- SE REALIZA EN CÓLICOS POR TORSIÓN, DESPLAZAMIENTO INTESTINAL, ESTRANGULACIÓN O IMPACTACIÓN SEVERA.
- PUEDE INCLUIR RESECCIÓN DE INTESTINO DAÑADO.
- REQUIERE HOSPITALIZACIÓN Y CUIDADOS POSTOPERATORIOS INTENSIVOS.



PREVENCIÓN DEL CÓLICO EN CABALLOS

ALIMENTACIÓN ADECUADA : PROPORCIONAR FORRAJE DE CALIDAD Y EVITAR CAMBIOS BRUSCOS EN LA DIETA.

✓ ACCESO CONSTANTE A AGUA LIMPIA Y FRESCA .

✓ EJERCICIO REGULAR : EVITAR EL SEDENTARISMO PARA ESTIMULAR LA MOTILIDAD INTESTINAL.

✓ DESPARASITACIÓN PERIÓDICA PARA PREVENIR OBSTRUCCIONES POR PARÁSITOS.

✓ EVITAR LA INGESTIÓN DE ARENA : USO DE COMEDEROS ELEVADOS Y SUPLEMENTOS DE PSYLLIUM.

✓ EVITAR EL ESTRÉS : MANTENER RUTINAS ESTABLES Y MINIMIZAR SITUACIONES DE ANSIEDAD.

✓ REVISIÓN DENTAL : PARA EVITAR PROBLEMAS DE MASTICACIÓN QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTACIONES.



BIBIOGRAFIA

<https://www.acvs.org/es/large-animal/colic-in-horses/>

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lico_equino

<https://www.msdivetmanual.com/es/propietarios-de-caballos/trastornos-digestivos-de-los-caballos/c%C3%B3lico-en-los-caballos>