



UNIDAD 4. Cuadro descriptivo de Parásitos externos de los  
ovinos y caprinos, Haciendo referencias del daño que  
provocan en el huésped

**Alumno:**

ANDRES GUTIERREZ JENNIFER ALONDRA

**Docente:**

MVZ. Velázquez Cancino Román R.

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS**

Tapachula, Chiapas

30 de Marzo del 2025

# PRINCIPALES PARÁSITOS EXTERNOS EN OVINOS Y CAPRINOS

## GARRAPATAS DURAS Y BLANDAS

- **Garrapatas duras** (*Rhipicephalus* , *Amblyomma* , *Ixodes*): Se adhieren fuertemente a la piel , alimentándose de sangre . ( *Rhipicephalus* , *Amblyomma* , *Ixodes* ): Se adhieren fuertemente a la piel, alimentándose de sangre.
- **Garrapatas blandas (falsa garrapata) - *Ornithodoros* spp.** : No permanecerán adheridas constantemente al huésped; atacan en intervalos y pueden transmitir enfermedades como la fiebre Q y la fiebre recurrente.

### Daños:

- Pérdida de sangre (anemia en infestaciones severas)
- Irritación y estrés, reduciendo la ganancia de peso y la producción de leche.
- Transmisión de enfermedades infecciosas (piroplasmosis, anaplasmosis, fiebre Q).
- Lesiones cutáneas que predisponen a infecciones secundarias.

## PIOJOS (MALÓFAGOS Y ANOPLURA)

- **Malófagos (*Damalinea* spp.)**: Se alimentan de detritos cutáneos y lana.
- **Anoplura (*Linognathus* spp.)**: Se alimenta de sangre.

### Daños:

- Prurito intenso, pérdida de lana o pelo.
- Lesiones por rascado, favoreciendo infecciones secundarias.
- Pérdida de peso debido al estrés.

## ÁCAROS (SARNA SARCÓPTICA, PSORÓPTICA Y CORIÓPTICA)

- ***Sarcoptes scabiei* (sarna sarcóptica)**: Forma túneles en la piel, provocando picazón intensa.
- ***Psoroptes ovis* (sarna psoróptica)**: Provoca formación de costras y caída de lana.
- ***Chorioptes bovis* (sarna coriódica)**: Afecta patas y ubres, causando inflamación.

### Daños:

- Prurito intenso, pérdida de lana y heridas.
- Desnutrición y pérdida de producción.
- Baja tasa reproductiva en infestaciones severas.

## MOSCAS Y MIASIS (MOSCA DE LOS CUERNOS Y GUSANO BARRENADOR)

- ***Haematobia irritans* (mosca de los cuernos)**: Se alimenta de sangre.
- ***Cochliomyia hominivorax* (gusano barrenador)**: Deposita huevos en heridas, provocando miasis.

### Daños:

- Infecciones secundarias y septicemia.
- Estrés y disminución de producción.