



CUADRO DESCRIPTIVO “PARÁSITOS EXTERNOS DE LOS OVINOS Y CAPRINOS”

FLORES VARGAS BELEN

MVZ. Velázquez Cancino Román R.

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y técnicas quirúrgicas de ovinos y caprinos

Tapachula Chiapas, 30 de marzo del 2025

PARÁSITOS EXTERNOS DE LOS OVINOS Y CAPRINOS

ÁCAROS



Sarcoptes scabiei y Psoroptes ovis.
Son parásitos microscópicos que se alojan en la piel.

DAÑO QUE PROVOCAN

La sarna sarcóptica provoca picazón severa, caída del pelo y lesiones en la piel que pueden llevar a infecciones secundarias y la psoróptica causa dermatitis, picazón intensa, pérdida de lana y, si no se trata desnutrición por incapacidad de alimentarse por la incomodidad.

MOSCAS



Melofagosis "falsa garrapata", Cochliomyia hominivorax (de lana), Oestrus ovis (de ojos).
Son insectos que infestan obligadamente en condiciones de clima cálido y húmedo.

DAÑO QUE PROVOCAN

La falsa garrapata se alimenta de sangre y hay debilitamiento, pérdida de peso y mala calidad del vellón, la mosca de los ojos causa irritación, conjuntivitis severa y molestias y mosca de lana causa miasis (infección de tejidos por larvas), que puede ser muy dolorosa y debilitar al animal.

PIOJOS



Bovicola y Linognathus.
Son insectos parásitos que viven en la piel y el pelo de los animales, alimentándose de sangre o secreciones dérmicas.

DAÑO QUE PROVOCAN

Prurito intenso que lleva a rascado y autolesiones, pérdida de pelo o lana, heridas (foco de infecciones bacterianas), irritación, frotación del cuerpo contra objetos, patadas y mordisqueos, vellón desarreglado y arranque de mechas que quedan colgando.

BIBLIOGRAFIA

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/material_tecnico_-_cartilla_sanitaria_no_1_ectoparasitos_de_los_ovinos.pdf

https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/parasitarias/parasitarias_ovinos/25-Mosca_Oestrus_Ovis.pdf

<https://www.insst.es/agentes-biologicos-basebio/otros/sarcoptes-scabiei>