




PARASITOS EXTERNOS

EMVZ Margarita Escobar Cruz

MVZ Velazquez Cancino Román Reyes

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PARÁSITOS EXTERNOS

GARRAPATA

se alimentan de la sangre de los ovinos. Son conocidas por su capacidad para transmitir diversas enfermedades

Rhipicephalus (Boophilus) microplus: Es una de las garrapatas más comunes en áreas tropicales y subtropicales. Esta garrapata es importante porque puede transmitir la anaplasmosis y la piroplasmosis, enfermedades que afectan a los ovinos

Daños que causan al huésped: Pérdida de sangre: Cuando las garrapatas se alimentan de la sangre del animal, pueden provocar anemia, especialmente si la infestación es severa o prolongada.

Irritación de la piel: Las picaduras repetidas pueden causar inflamación, enrojecimiento y otros problemas dermatológicos

MOSCAS

Moscas: Las mosca de los ovinos (Lucilia cuprina), pueden causar problemas como la miasis o infección de heridas por larvas, que afecta especialmente a los corderos y animales con heridas abiertas

LESIONES

Miasis: Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas o áreas húmedas y sucias de los animales, Al eclosionar los huevos, se alimentan de los tejidos vivos o muertos de los ovinos, causando ulceraciones y descomposición de la piel, lo que puede llevar a infecciones graves

- Tratamiento: Uso de insecticidas: Se pueden usar productos formulados para matar tanto a las larvas como a las moscas adultas
- Baños de insecticidas: Se pueden utilizar baños de acaricidas o insecticidas para el control
- polvos repelentes: Los productos en spray o polvo pueden aplicarse directamente sobre la piel de los ovinos para repeler las moscas

PIOJOS

Piojos: Los piojos son comunes en los ovinos, especialmente en aquellos que viven en condiciones de hacinamiento. Los piojos masticadores (Bovicola ovis) son los más prevalentes, causando irritación en la piel y pérdida de lana.

- Irritación y picazón: La infestación por piojos generalmente causa picazón intensa, lo que lleva a los ovinos a rascarse y frotarse constantemente, aumentando el riesgo de heridas en la piel.
- Pérdida de lana: Uno de los signos más evidentes de infestación por Bovicola ovis es la pérdida de lana.

- Inflamación de la piel: Las lesiones causadas por el rascado frecuente pueden llevar a inflamación, enrojecimiento.
- Anemia leve: En infestaciones muy severas, el daño continuo a la piel y el consumo de sangre puede ocasionar una anemia leve.

- Deltametrina: Un acaricida que también puede ser usado para baños o sprays y es eficaz contra los piojos.
- ivermectina: Un antiparasitario de amplio espectro, generalmente administrado por vía subcutánea o oral, que también tiene actividad contra los piojos.

BIBLIOGRAFÍA:

https://www.google.com/search?q=parasitos+externos+en+ovinos&oq=pa&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYJxg7GIAEGloFMg4IABBFGCcYOxiABBiKBTIGCAEQRRhAMgYIAhBFGDkyDAgDECMYJxiABBiKBTIQCAQLhjHARixAxjRAXiABDIQCAUQLhjHARixAxjRAXiABDINCAyQLhjUAhixAxiABDINCAcQLhjUAhixAxiABNIBCTM3MjhqMGoxNagCCLAC

https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/bitstream/handle/20.500.12123/2365/INTA_CRPatagoniaNorte_EEABariloche_Larroza_M_Parasitos_Externos_Ovinos.pdf?sequence=1&isAllowed

https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/bitstream/handle/20.500.12123/2365/INTA_CRPatagoniaNorte_EEABariloche_Larroza_M_Parasitos_Externos_Ovinos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

