



SUPER NOTA

HERNANDEZ SOLORIO JOSE JULIAN

M.V. Z ROMAN REYES VASQUEZ CANCINO

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
OVINOS Y CAPRINOS

Tapachula, Chiapas 29 de marzo del 2025

PARASITOS EXTERNOS DE LOS OVINOS Y CAPRINOS

ÁCAROS (SARNAS)

Los ácaros son artrópodos microscópicos que causan sarna, una enfermedad altamente pruriginosa y contagiosa.

- Sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei* var. *ovis* y var. *caprae*)
 - Afecta principalmente la cabeza, orejas, hocico y pliegues cutáneos.
 - Provoca intenso prurito, descamación y formación de costras.
 - Puede causar pérdida de peso y disminución en la producción.

- 1. Sarna coriódptica (*Chorioptes bovis*, *Chorioptes caprae*)
 - Menos severa, afecta principalmente las extremidades y la base de la cola.
 - Provoca descamación y picazón moderada.

- Sarna psoróptica (*Psoroptes ovis*, *Psoroptes cuniculi*)
 - Ataca principalmente el cuerpo y la base de la lana o el pelaje.
 - Se observa formación de costras y caída de lana.
 - Altamente contagiosa y difícil de erradicar.

PIOJOS

Los piojos son insectos sin alas que se alimentan de sangre (piojos chupadores) o piel y secreciones dérmicas (piojos masticadores). Se propagan por contacto directo entre animales.

- Piojos chupadores:**
 - Linognathus ovalis* y *Linognathus africanus*
 - Se alimentan de sangre y pueden causar anemia en infestaciones severas

- Piojos masticadores:**
 - Bovicola ovis* (en ovinos) y *Bovicola caprae* (en caprinos)
 - Causan picazón intensa, pérdida de lana y lesiones por rascado.

GARRAPATAS

Las garrapatas son ácaros hematófagos que pueden transmitir enfermedades graves, como la anaplasmosis y la babesiosis.

- Principales especies que afectan a ovinos y caprinos:
 - Rhipicephalus* spp.
 - Amblyomma* spp.
 - Ixodes* spp.
 - Hyalomma* spp.

Las garrapatas pueden causar anemia, pérdida de peso y formación de abscesos en el sitio de la picadura.

MOSCAS (Miasis y Mosca del Cuerno)

- Miasis (gusanos en la piel)
 - Lucilia sericata*, *Cochliomyia hominivorax*
 - Depositán huevos en heridas o áreas húmedas, causando infestaciones de larvas (bicheras).
 - Puede provocar infecciones secundarias y hasta la muerte si no se trata.

- Mosca del cuerno (*Haematobia irritans*)**
 - Se alimenta de sangre y causa estrés, anemia y disminución en la producción de leche y carne.

BIBIOGRAFIA

https://www.google.com/search?q=parasitos+externos+ovinos&sca_esv=51f735ba70c6119c&rlz=1C1VDKB_esMX1018MX1018&sxsrf=AHTn8zrLItNfGQ5PSk1uDup18Zi8flgUrw%3A1743271795666&ei=czfoZ9CyKKunkPIPhP-HmAk&oq=parasitos+externos+OV&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFXBhcmFzaXRvcyBleHRlcm5vcyBPVioCCAAYBhAAGBYHjIGEAAYFhgeMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIhRRQAFjIB3AAeAGQAQCYAa0EoAGSDaoBCTAuMS40LTEuMrgBAcgBAPgBAZgCBKAC0g3CAgoQABiABBhDGloFwgIFEAAygATCAgoQABiABBgUGlcCmAMAKgcHMC4xLjQtM6AHtxU&sclient=gws-wiz-serp