

PALATOPLASTÍA

CUIDADO DE SU CIRUGIA DE PALADAR

MANTENER LIMPIA LA HERIDA

Irrigar y limpiar adecuadamente con agua en jeringa y catéter hasta que se mire limpia la hendidura entre los surcos

ALIMENTACION POR 15 DIAS

Uso de dispositivos auxiliares: Biberones especiales con tetinas adaptadas o placas obturadoras para mejorar la succión.



SÍ VASO O CUCHARA



NO TOMAR BEBIDAS CON POPOTES (POR LA SUCCION), NO USAR CHUPONES Y NO DAR BEBIDAS CON GAS.



COMIDA BIEN MOLIDA, EN PAPILLA Y CON CUCHARA DE PLASTICO SUAVE:

- CALDO DE POLLO O
- VERDURAS
- PAPILLA DE FRUTA O
- VERDURA
- ATOLE
- FRIJOLES MOLIDOS SIN PIEL
- HUEVO
- TORTILLA SUAVE
- GELATINA



NO PUEDE COMER NADA QUE TENGA QUE MORDER, QUE ESTÉ DURO Ó SE QUEDE PEGADO EN LA BOCA (PAN, GALLETA, HARINAS)

INJERTO ÓSEO ALVEOLAR.

CUIDADO DE SU CIRUGIA

- EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA.



- EVITAR QUE EL PACIENTE SE INTRODUZCA EL DEDO Y OBJETOS (POPOTES, JUGUETES, ETC.) EN LA BOCA.

ALIMENTACIÓN POR 4 SEMANAS

COMIDA BIEN MOLIDA, EN PAPILLA Y CON CUCHARA DE PLASTICO SUAVE:



SEGUIR LAS INDICACIONES DE SU MENU



MISIÓN 33 A.C
CON AMOR POR UNA SALUD INTEGRAL
LABIO PALADAR HENDIDO Y ANOMALÍAS CRANEOFACIALES.



CUIDADOS POST QUIRURGICOS

MISIÓN 33 a.c

CUIDADOS GENERALES



DARLE SUS MEDICAMENTOS COMO INDICÓ EL DOCTOR

Evitar contacto con personas para no enfermarse



Bañarle y mantenerlo limpio/a



Evitar golpes y caídas (usar coderas)



Descansar bien / dormir (usando coderas)



Nada caliente



DATOS DE ALARMA Y ESTAR AL PENDIENTE

DE:

SANGRADO FRESCO Y ABUNDANTE (SANGRE ROJA Y BRILLANTE)



MAL OLOR PERCIBIDO AL MOMENTO DE ABRIR LA BOCA O POR LA NARIZ

FIEBRE (TEMPERATURA CON TERMOMETRO MAYOR A 37.9°C)



MANTENERLO CONTENTO Y DE BUEN ANIMO



NO COMER/TOMAR

**CAFÉ
TOSTADAS
REFRESCO
IRRITANTE
PAPAS FRITAS**



**PAN/GALLETAS
FRUTOS ÁCIDOS
DULCES/AZÚCAR
LÁCTEOS**

KIT DE CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS

Un Jugó Jumex o Del Valle clarificado de manzana (no puede ser néctar)



Una jeringa de 10mL y otra de 20mL



kit de limpieza nasal



Cepillo dental extra suave o de bebé



Un par de coderas (Solo Queiloplastias)

QUEILOPLASTÍA

CUIDADO DE SU CIRUGIA DE LABIO

MANTENER LIMPIA LA HERIDA

GASA



MICRODACYN

RECOVERON NC



COTONETE

HACER LO SIGUIENTE 3 VECES AL DÍA Y DESPUÉS DE COMER

1. Humedecer la gasa en agua hervida o microdacyn
2. Limpiar suavemente la herida, quitar mocos, comida y resto de sangre.
3. Con un cotonete limpiar dentro de la nariz.
4. Conformadores: limpiar con irrigacion nasal y agua o con cotonete
5. Poner recoveron NC sobre la herida

ALIMENTACIÓN POR 15 DÍAS (NO biberón ni amamantar)

COMIDA BIEN MOLIDA, EN PAPILLA Y CON CUCHARA

- CALDO DE POLLO O VERDURA
- PAPILLA DE FRUTA O VERDURA
- FRIJOLES MOLIDOS
- HUEVO
- GELATINA