



INFOGRAFIA:

**VULVOLOPATIAS, ENDOCARDITIS,
PERICARDITIS**

**MINA GUTIERREZ
MARIA FERNANDA**

**MAESTRA:
NIUZET ADRIANA CRUZ PáEZ**

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA


ENFERMERIA CLINICA II

TAPACHULA, CHIAPAS

08 DE MARZO DEL 2025




VULVOLOPATIAS, ENDOCARDITIS, PERICARDITIS




VULVOLOPATIAS

Son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La función de las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse correctamente durante el ciclo cardiaco. Esto permite el paso de la sangre de una cavidad a otra y que pueda avanzar sin retroceder.

La más frecuente es la valvulopatía degenerativa en pacientes ancianos, que consiste en el envejecimiento, endurecimiento y calcificación de las válvulas, lo que limita su movilidad y afecta a su funcionamiento



LAS CUATRO VÁLVULAS DEL CORAZÓN QUE PUEDEN TENER ENFERMEDADES SON:



SINTOMAS


- Dolor en el pecho: Puede ser opresivo o punzante.
- Falta de aire: Especialmente al estar recostado.
- Palpitaciones: Sensación de que el corazón late rápido, fuerte o aletea.



ENDOCARDITIS

La endocarditis es una inflamación del revestimiento interno de las cavidades y las válvulas del corazón (endocardio) que puede poner en riesgo la vida.

Ocurre cuando las bacterias u otros gérmenes ingresan en el torrente sanguíneo y se dirigen al corazón. Luego, los gérmenes se adhieren a las válvulas cardíacas o al tejido cardíaco dañados.



SINTOMAS

- Dolor en las articulaciones y los músculos
- Dolor en el pecho cuando respiras
- Fatiga
- Síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y escalofríos
- Sudoraciones nocturnas
- Falta de aire




COMPLICACIONES

- Insuficiencia cardíaca
- Daño en las válvulas cardíacas
- Accidente cerebrovascular
- Bolsas de pus acumulado (abscesos) que se forman en el corazón, el cerebro, los pulmones y otros órganos

PERICARDITIS

Es la hinchazón e irritación del tejido delgado en forma de saco circundante al corazón. Este tejido recibe el nombre de pericardio. La pericarditis a menudo causa un dolor de pecho agudo. El dolor de pecho se produce cuando las capas irritadas del pericardio se frotan entre sí.



SINTOMAS

- Tos
- Cansancio o sensación general de debilidad o de estar enfermo
- Hinchazón en las piernas o los pies
- Fiebre leve
- Palpitaciones, que son latidos cardíacos fuertes o acelerados



TIPOS

- La pericarditis aguda comienza de manera repentina, pero no dura más de cuatro semanas.
- La pericarditis recurrente se produce entre 4 y 6 semanas después de un episodio de pericarditis aguda.
- La pericarditis incesante dura alrededor de 4 a 6 semanas, pero menos de tres meses.
- La pericarditis constrictiva crónica suele desarrollarse lentamente y dura más de tres meses.



CAUSAS

- Tras una lesión cardíaca debida a un ataque cardíaco o a una cirugía cardíaca.
- Infecciones, como las causadas por virus.
- Lesión en el corazón o el tórax.
- Lupus.
- Artritis reumatoide.

BIBLIOGRAFIA

- <https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/valvulopatias.html>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/endocarditis/symptoms-causes/syc-20352576>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pericarditis/symptoms-causes/syc-20352510>