



Cuadro comparativo

NOMBRE: ALESSANDRA RESENDIZ ESTRADA

DOCENTE: NIUZET ADRIANA CRUZ PAEZ

MATERIA: Ginecología y obstetricia

LIC. EN ENFERMERIA

TAPACHULA CHIAPAS

08 de Marzo del 2025

→ Diferencias de el embarazo monocigotico y dicigotico

	EMBARAZO MONOCIGOTICO	EMBARAZO DICIGOTICOS
DEFINICION	Es un embarazo múltiple en el que se desarrollan dos o más fetos que son idénticos entre sí.	Es un embarazo múltiple en el que dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides diferentes.
COMO SE LES NOMBRA	Los gemelos idénticos también son llamados gemelos monocigotos.	Los bebés que nacen de este tipo de embarazo se llaman mellizos o gemelos fraternos.
CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Los fetos comparten el mismo material genético. • Son idénticos física y genéticamente. • Tienen el mismo sexo. • Pueden compartir la placenta y/o la bolsa amniótica, dependiendo del momento de la división 	<ul style="list-style-type: none"> • Los mellizos pueden ser de diferente sexo. • Pueden tener diferente grupo sanguíneo. • Pueden verse diferente o parecerse mucho. • Comparten la mitad de sus genomas, como cualquier otro hermano.
DIFERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se produce cuando un solo óvulo es fertilizado por un solo espermatozoide. • Los gemelos monocigóticos comparten el 100% de su ADN. • Siempre son del mismo sexo. 	<ul style="list-style-type: none"> • También se le conoce como embarazo de mellizos o gemelos fraternos. • Se produce cuando dos óvulos diferentes son fertilizados por dos espermatozoides diferentes.

→ Diferencias de el embarazo

EMBARAZO GEMELAR	EMBARAZO TRILLIZOS	EMBARAZO DE PRODUCTO UNICO
<p>Es el que se produce cuando dos fetos se desarrollan en el útero de una mujer en la misma gestación. Puede ser de dos tipos: gemelos dicigóticos (fraternos) y monocigóticos (idénticos).</p>	<p>Un embarazo de trillizos es un embarazo en el que se gestan tres bebés al mismo tiempo. Los trillizos pueden ser idénticos, fraternos o mixtos.</p>	<p>Un embarazo único es la gestación que se produce cuando un óvulo es fecundado por un solo espermatozoide, lo que da lugar a un solo feto. Son los embarazos más frecuentes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Son genéticamente idénticos y del mismo sexo • Se forman a partir de un único óvulo fecundado • Son más frecuentes en el sexo femenino 	<ul style="list-style-type: none"> • El aumento de peso puede ser mayor a lo normal y muy rápido. • El útero puede ser más grande de lo esperado. • Los niveles de la hormona hCG en sangre pueden estar elevados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se produce cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide • El embarazo intrauterino es el tipo de embarazo más común • El tiempo de gestación va desde las 38 hasta las 42 semanas
<ul style="list-style-type: none"> • Los gemelos son genéticamente idénticos y comparten rasgos físicos. • En raras ocasiones, los gemelos no se separan completamente y nacen unidos, como los gemelos siameses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se produce cuando se fecundan tres óvulos por tres espermatozoides. • También puede ocurrir cuando un óvulo se fecunda por un espermatozoide y luego se divide en tres. • Los trillizos pueden ser idénticos o no. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los síntomas de un embarazo gemelar son similares a los de un embarazo único, pero suelen aparecer antes y ser más intensos. Además, el útero es más grande y se puede sentir más pesadez.

Bibliografía

<https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-multiple/>

<https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/twin-pregnancy/art-20048161>

<https://www.dexeus.com/informacion-de-salud/enciclopedia-ginecologica/obstetricia/embarazo-gemelar>