



Infografía:
Atención Prenatal

**MINA GUTIERREZ
MARIA FERNANDA**

Maestra:
NIUZET ADRIANA CRUZ PAEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en enfermería

Ginecología y Obstetricia

Tapachula, Chiapas

24 de enero del 2025



Maternity



Pregnancy



¿Que es?

Es la atención médica que recibe una mujer mientras esta embarazada



Objetivo

- Identificación de condiciones de salud Preexistentes.
- Detección temprana de complicaciones que surgen durante el embarazo.
- Fomento de la salud

1ra consulta.

Es la primera visita que se realiza para evaluar el estado de salud de la madre y del feto durante el embarazo.

- Se revisan los antecedentes médicos
- Se realiza un examen pélvico.
- Se toma una muestra de sangre



2da consulta.

Visita médica que se realiza durante el segundo trimestre de embarazo. Se realizan

Pruebas de laboratorio y se miden los avances del bebé.

- Pesarse a la paciente
- Medir la presión arterial
- Medir el abdomen para verificar el crecimiento del bebé.
- Realizar una ecografía morfológica para examinar el feto.



3ra consulta.

Del 3. trimestre de embarazo consiste en un control de salud de la madre y del bebé

- Revisar los movimientos y el latido del corazón del bebé.
- Realizar un control no invasivo para comprobar la salud del feto
- Realizar una prueba de contracciones con estrés.

Maniobras de Leopold.



¿Que es?


Son las palpaciones abdominales que se realizan en la mujer embarazada, para determinar la presentación, situación y posición del feto.

1. Situación:

Evalua la altura de fondo uterino. Se realiza ubicado a la derecha y frente del paciente, se palpa con ambas manos abdomen superior.



~~21/01/25~~




3. Presión

El aumento de la presión en la cavidad torácica puede ser causado por una obstrucción de la vía aérea superior o por un aumento de la presión en la cavidad abdominal.



3. Presión

El aumento de la presión en la cavidad torácica puede ser causado por una obstrucción de la vía aérea superior o por un aumento de la presión en la cavidad abdominal.



4. Anestesia

El grado de anestesia depende de la dosis de la droga utilizada. La anestesia puede ser general o local.



La anestesia general es causada por la administración de drogas que actúan sobre el sistema nervioso central. La anestesia local es causada por la administración de drogas que actúan sobre el sistema nervioso periférico.

Bibliografía

- <https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/embarazo/atencion-prenatal>