



# **embarazos monocigoticos y bicigoticos, embarazo múltiple**

**Cristina Concepción Ávila Gordillo**

**lic.Niuzet Adriana Cruz Paez**

**GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Licenciatura en enfermería**

**Tapachula, Chiapas**

**8 de marzo del 2025**

<i>Descripción</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>DIAGNOSTICO</i>	<i>FACTORES DE RIESGO</i>	<i>TRATAMIENTO</i>
<i>embarazos monocigóticos</i>	<p>Ocurre cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y luego se divide en dos o más embriones. Los gemelos monocigóticos comparten el mismo material genético, por lo que son idénticos (mellizos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de sangre</li> <li>• Monitoreo fetal</li> <li>• <u>Ecografías Doppler</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Náuseas y <u>vómitos</u></li> <li>• Fatiga</li> <li>• Micción frecuente</li> <li>• Dolor de espalda</li> <li>• <u>Estreñimiento</u></li> <li>• Hinchazón en las piernas y los tobillos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Parto Prematuro</u></li> <li>• Preeclampsia</li> <li>• <u>Diabetes Gestacional</u></li> <li>• Restricción del crecimiento fetal</li> </ul>
<i>Embarazo de dicigóticos</i>	<p>es aquel en el que dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides. Cada feto tendrá su propia bolsa y su propia placenta. Los fetos serán distintos entre ellos e incluso pueden tener distinto sexo.</p>	<p>generalmente se realiza mediante ultrasonido, identificando las características de la placenta y los sacos amnióticos. Un seguimiento prenatal riguroso es esencial para prevenir y tratar posibles complicaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parto prematuro</li> <li>• Síndrome de transfusión feto-fetal (STFF)</li> <li>• Gemelos unidos (siameses)</li> </ul>	
<i>embarazo múltiple</i>	<p>es la gestación en la que se desarrolla más de un feto, como resultado de la fecundación de dos o más óvulos o cuando un óvulo se divide.</p>	<p>-diagnóstico temprano</p> <p>-<u>ecografías</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nacimiento prematuro</u></li> <li>• Hipertensión inducida por el embarazo más grave que en los embarazos de un solo bebé</li> <li>• Anemia</li> <li>• Aborto</li> <li>• Parto con cesárea</li> <li>• Hemorragia posparto</li> <li>• Diabetes gestacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor nutrición</li> <li>• Consultas más frecuentes</li> <li>• Remisión a un perinatólogo (especialista materno-fetal) para coordinar el seguimiento</li> <li>• Más descanso</li> <li>• Determinar cómo será el parto según la condición</li> </ul>

# Bibliografía

[https://www.bing.com/search?  
q=embarazo+m%C3%BAltiple&form=ANNTH1&refig=5c86b98  
20e7045a1840e103c6a01cbc3&pc=LCTSn](https://www.bing.com/search?q=embarazo+m%C3%BAltiple&form=ANNTH1&refig=5c86b9820e7045a1840e103c6a01cbc3&pc=LCTSn)

[LCTShttps://www.topdoctors.mx/diccionario-  
medico/embarazo-gemelar/n](https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/embarazo-gemelar/n)

[/https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/gemelos-  
monocigoticos](https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/gemelos-monocigoticos)