

---

UDS



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

docente: cruz paez niuzet adriana

alumna :Angela yahaira garcia reyes

Tapachula , chiapas a 18 de enero del 2025

# → TOXOPLASMOSIS Y TOSFERINA

CONCEPTS	SINTOMAS	COMO SE DETECTA	COMO EVITARLA
<p>La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito llamado <b>Toxoplasma gondii</b>. A menudo, las personas contraen esta infección por comer carne poco cocida. También puedes contraerla por el contacto con heces de gato. El parásito se puede transmitir al bebé durante el embarazo.<sup>8</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiebre.</li><li>• Hinchazón de los ganglios linfáticos que puede durar semanas.</li><li>• Dolor de cabeza.</li><li>• Dolores musculares.</li><li>• Sarpullido en la piel.</li></ul>	<p>La toxoplasmosis se detecta en humanos mediante un examen de sangre y otros estudios.</p> <p>Examen de sangre</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se analiza la presencia de anticuerpos contra el parásito <b>T. Gondii</b> en la sangre</li><li>• Se analiza la presencia del parásito <b>T. Gondii</b> o su ADN en la sangre</li></ul>	<p>Limpiar diariamente la bandeja sanitaria de los gatos y lavarse bien las manos. posteriormente. Cocinar bien la carne y lavar bien las verduras antes de consumirlas</p>
<p>La tos ferina o tos convulsiva es una infección bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede durar semanas o incluso meses. Es causada por una bacteria que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.</p>	<p>rinitis, estornudos, febrícula (si la hay), lagrimeo, tos leve, seca e irritativa, que se va haciendo cada vez más intensa, de predominio nocturno y que puede provocar vómitos.</p>	<p>La prueba de tos ferina se usa para saber si usted o su niño tienen tos ferina. Recibir un diagnóstico y tratamiento en las primeras etapas de la infección puede hacer que los síntomas sean menos graves y ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.</p>	<p>La mejor forma de prevenir la tos ferina es mediante la vacuna contra la pertusis que los médicos suministran junto con otras vacunas que actúan contra otras dos enfermedades graves: la difteria y el tétanos. Los médicos recomiendan comenzar la vacunación durante la infancia</p>

