



Mi Universidad

Cuadro Comparativo.

Nombre del Alumno: Michelle Andrés Gamboa López.

Materia: Enfermería Médico Quirúrgica I.

Docente: Ariadne Danahe Vicente Albores.

Licenciatura en Enfermería.

Quinto Cuatrimestre.

LAS HERIDAS.

Cortante	Punzante	Contusa	Por desgarro	Por raspadura	Superficial	Profunda	Penetrante	Aguda	Crónica
Es ocasionada por un objeto cortante, como un cuchillo o un vidrio.	Es producida por un objeto punzante, como un clavo.	Es ocasionada por el impacto de un objeto como una piedra o un martillo.	Es producida por objetos con dientes en su parte cortante, como una motosierra.	Producidas por objetos con dientes o palas.	Cuando solo atraviesa la piel.	Cuando la herida atraviesa el tejido subcutáneo.	Cuando penetra una cavidad, como puede ser la boca, el abdomen, la vagina, etc.	Es aquella que el organismo es capaz de cerrar o sanar en el tiempo esperado.	Es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado, ya que la herida suele ser más profunda y la zona suele estar inflamada.
Los bordes de la herida están limpios y definidos.	La gravedad de la herida depende de la profundidad y de si daña nervios o vasos sanguíneos.	En estas heridas, los bordes son irregulares y suelen presentar un hematoma.	Los bordes son irregulares.	La piel se arrastra por él en un accidente de tráfico.				La cicatrización se producirá sin infección y en un periodo que suele oscilar entre siete y catorce días.	El proceso de reparación y cicatrización es desordenado se alarga en el tiempo.
En este tipo de heridas, el sangrado suele ser abundante.		Desarrollo de los senos, la salud de los huesos, el embarazo y la fecundidad.		La carne queda al descubierto.					