



HOJA DE PRESENTACION

ANA NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ

**LIC. ARIADNE DANAHE VICENTE
ALBORES**

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

ENFERMERIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

TAPACHULA, CHIAPAS

3 DE MARZO DEL 2025

CARTILLA DE VACUNACIÓN DE 0-9 AÑOS




VACUNAS	ENFERMEDADES QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD DE VACUNACIÓN OPORTUNA
BCG	TUBERCULOSIS	UNICA	AL NACER
HEPATITIS B	HEPATITIS B <small>(una enfermedad que afecta el hígado)</small>	UNICA	AL NACER
HEXAVALENTE	DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, POLIOMELITIS E INFECCIONES POR H. Influenza	PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA	2 MESES 4 MESES 6 MESES 18 MESES
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TETANOS	REFUERZO	4 AÑOS
ROTAVIRUS	DIARREA	PRIMERA SEGUNDA TERCERA	2 MESES 4 MESES 6 MESES

VACUNAS	ENFERMEDADES QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD DE VACUNACIÓN OPORTUNA
NEUMOCOCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA SEGUNDA TERCERA	2 MESES 4 MESES 12 MESES
INFLUENCIA	TOS Y GRIPA	PRIMERA SEGUNDA REVACUNACION	6 MESES 7 MESES ANUAL
SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA REFUERZO	1 AÑO 6 AÑOS
SABIN	POLIOMELITIS	ADICIONALES	ADICIONALES
SR	SARAMPION Y RUBÉOLA	ADICIONALES	REFUERZO



CARTILLA DE VACUNACIÓN DE 10-19 AÑOS



VACUNAS	ENFERMEDADES QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD DE VACUNACIÓN OPORTUNA
HEPATITIS B (LOS QUE NO SE HAN VACUNADO)	HEPATITIS B (una enfermedad que afecta el hígado)	PRIMERA SEGUNDA	<ul style="list-style-type: none"> • APARTIR DE LOS 11 AÑOS • 4 SEMANAS POSTERIORES A LA PRIMERA
TD	TÉTANOS Y DIFTERIA	<ul style="list-style-type: none"> • CON ESQUEMA COMOLETO (REFUERZO) • CON ESQUEMA INCOMPLETO PRIMERA SEGUNDA TERCERA 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 AÑOS DE EDAD DOSIS INICIAL • 1 MES DESPUÉS DE LA PRIMERA • 12 MESES POSTERIORES
TDPA	DIFTERIA, TOSFERINA, Y TÉTANOS,	UNICA	APARTIR DE LA SEMANA 20 DEL EMBARAZO
INFLUENCIA	OS Y GRIPA	UNICA	CUALQUIER TRIMESTRE DEL EMBARAZO
SR (LOS QUE NO HAN SIDOS VACUNADOS O TIENEN ESQUEMA INCOMPLETO)	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	SIN ATECEDENTE VACUNAL PRIMER SEGUNDA CON ESQUEMA COMPLETO DOSIS UNICA	<ul style="list-style-type: none"> • EN EL PRIMER CONTACTO • 4 SEMANAS DESPUÉS DE LA PRIMERA • EN EL PRIMER CONTACTO
VPH	INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	PRIMERA SEGUNDA TERCERA	<ul style="list-style-type: none"> • MUJERES EN 5º DE PRIMARIA Y DE 11 AÑOS DE EDAD NO ESCOLARIZADAS • 6 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS • 60 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS

